

پر بہتر علاج سے بہتر ہے

# جانوروں کی اہم وبائی بیماریاں اور ان سے بچاؤ

صحت مند جانور ہی بہتر پیداوار اور منافع بخش ڈیری فارمنگ کے ضامن ہوتے ہیں  
باڑے میں موجود تمام جانوروں کا صبح و شام بغور مشاہدہ کر کے بیمار جانور کی بروقت پہچان کریں

(بروقت تشخیص، موثر علاج)

## منہ کھر



تیز بخار، دودھ کی پیداوار میں کمی، زبان، تالو، کھروں اور حوانے پر چھالے، لنگڑاپن، منہ سے جھاگ نما رال ٹپکنا اہم علامات ہیں

## گل گھوٹو



تیز بخار، گلے اور زبان کی سوزش، سانس میں دشواری  
اور خرخرہٹ کی آواز، منہ اور ناک سے رال ٹپکنا اہم علامات ہیں

## چوڑے مار (بلیک کوائر)



تیز بخار، ران یا شانے کے پٹھوں پر شدید سوزش، سوزش والی جگہ کا گرم ہونا، چرچراہٹ کی  
آوازیں اور لنگڑاپن اہم علامات ہیں بروقت اور موثر حفاظتی ٹیکہ جات کی منصوبہ بندی  
سے ان اہم وبائی بیماریوں سے مکمل طور پر بچا جاسکتا ہے



اے ایس ایل پی ڈیری پراجیکٹ، یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز، لاہور

فون: 042-37212339 ویب سائٹ: www.aslpdairy.pk



مرض	ٹیکہ لگانے کا وقت	موثر دورانیہ
گل گھوٹو	مئی، جون اور نومبر، دسمبر	6 ماہ
منہ کھر	فروری، مارچ اور ستمبر، اکتوبر	6 ماہ
چوڑے مار	اپریل	ایک سال

### حفاظتی ٹیکہ جات کیلئے اہم تجاویز



حفاظتی ٹیکہ جات کو ہمیشہ 4 ڈگری سینٹی گریڈ پر ریفریجریٹر میں محفوظ کریں  
 ٹیکہ جات کو ہمیشہ مطلوبہ مقدار میں ذیر جلد لگائیں  
 موثر نتائج کے حصول کے لئے لیبل پر درج ہدایات کے مطابق  
 حفاظتی ٹیکہ جات کا مکمل کورس کروائیں  
 چھوٹے بچوں کو دو ہفتے کی عمر کے بعد حفاظتی ٹیکے لگوائیں

حفاظتی ٹیکہ جات ہمیشہ مستند ذرائع سے ہی حاصل کریں اور  
 مزید معلومات کے لئے اپنے قریبی ماہر ویٹرنری ڈاکٹر سے رجوع کریں



اے ایس ایل پی ڈیری پراجیکٹ، ویٹرنری آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز، لاہور

فون: 042-37212339 ویب سائٹ: www.aslpdairy.pk





پرہیز علاج  
سے بہتر ہے

# جانوروں کے کرم اور ان سے بچاؤ

کرم جانوروں کی پیداواری صلاحیت کو متاثر کرتے ہیں اور مختلف بیماریاں پھیلا کر  
ڈیری فارمرز کے معاشی نقصان کا باعث بنتے ہیں

خون کی کمی، خشک اور کھردری جلد، پیٹ کا لٹکنا، آنکھوں میں گد اور دودھ کی پیداوار میں شدید کمی اہم علامات ہیں

اندرونی کرم



جگر کے کرم



پھیپھڑوں کے کرم



پیٹ اور انتڑوں کے کرم

بے چینی کی کیفیت، خون کی کمی، کمزور اور لاغر، جلد پر سوراخ اور جانوروں کی پیداواری صلاحیت میں کمی اہم علامات ہیں

بیرونی کرم



پھیپھڑوں کے کرم

جانور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، تیز بخار، پانی اور خون کی کمی، رت موتر میں جانور کا پیشاب سرخی مائل ہو جاتا ہے  
گلیوں میں سوزش ہو جانا گلیوں کے بخار کی ایک نمایاں علامت ہے

چیچروں سے  
پھیلنے والی بیماریاں



اے ایس ایل پی ڈیری پراجیکٹ، یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز، لاہور

فون: 042-37212339 ویب سائٹ: www.aslpdairy.pk



## کرموں کی روک تھام کے لئے اہم تجاویز

- ▶ باقاعدگی سے دن میں کم از کم دو دفعہ باڑے کی صفائی ضرور کریں اور پانی کھڑا نہ ہونے دیں
- ▶ چھوٹے بچوں کو باقاعدگی سے ہر تین ماہ بعد اور بڑے جانوروں کو حسب ضرورت کرم کش ادویات ماہرو بیٹرنری ڈاکٹر کے مشورے سے پلائیں
- ▶ اگر علاقے میں سہولت موجود ہو تو لیبارٹری سے گوبر کا ٹیسٹ بھی کروالینا چاہیے
- ▶ باڑے کی دیواروں یا چھت پر کوئی سوراخ اور انہیں ہونی چاہیے جہاں یہ بیرونی کرم انڈے دے سکیں یا چھپ سکیں
- ▶ باڑے میں ہر مہینے باقاعدگی سے چیچڑ کش ادویات کا سپرے کریں
- ▶ وقتاً فوقتاً باڑے میں بجھے ہوئے چونے کا چھڑکاؤ بھی کریں
- ▶ چارے کی صفائی کا خیال رکھیں اور کترے ہوئے چارے کو گرد سے بچائیں
- ▶ کرم کش دوائی ہر دفعہ بدل کر پلانی چاہیے تاکہ کرم ایک ہی دوائی کے خلاف قوتِ مدافعت حاصل نہ کر سکیں
- ▶ پانی کی حوضی میں بھی چونا استعمال کریں تاکہ جراثیم سے بچا جاسکے
- ▶ جانوروں پر چیچڑوں کے شدید حملے کی صورت میں جلد پر چیچڑ کش ادویات لگائیں اور مزید ہدایات کے لئے اپنے قریبی ڈاکٹر سے رجوع کریں





# ساڑو / سوزش حیوانہ سے بچاؤ



تھن اور حیوانہ کی سوزش کو عرف عام ساڑو کہا جاتا ہے



متاثرہ جانوروں کے دودھ کے معیار اور مقدار میں شدید کمی کی وجہ سے جانور بے کار ہو جاتے ہیں جو کہ ڈیری فارمر کے معاشی نقصان کا باعث بنتا ہے

## اسباب ساڑو / سوزش حیوانہ



- ★ باڑے میں صفائی ستھرائی کا غیر مناسب انتظام
- ★ حیوانے / تھن پر ذخم اور اس کے علاج پر توجہ نہ دینا
- ★ پھپھوندی لگی خوراک کا استعمال کرنا
- ★ بچوں کو دودھ دوسنے کے بعد دودھ پلانا
- ★ گندے ہاتھوں اور غلط طریقہ کار سے دودھ دونا

## علامات ساڑو (ظاہری حالت میں)



- ★ حیوانہ میں اچانک سوزش، رنگت سرخی مائل، چھونے پر گرم اور جانور درد محسوس کرتا ہے
- ★ جانور کو تیز بخار ہو جاتا ہے اور وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے
- ★ دودھ کی پیداوار میں خاطر خواہ کمی اور دودھ میں پھٹکیاں نظر آتی ہیں
- ★ متاثرہ جانور کا دودھ بدبودار اور نمکین ہو جاتا ہے
- ★ موثر اور بروقت علاج نہ ہونے کی صورت میں تھن کے اندر ناٹمودار ہو جاتی ہے اور حیوانہ کا ایک یا ایک سے زیادہ حصہ سکڑ جاتا ہے

## علامات ساڑو (مخفی حالت میں)

- ★ جانور بظاہر تندرست نظر آتا ہے اور تھن / حیوانہ کی ساخت میں بظاہر کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی
- ★ جانور کو بخار بھی نہیں ہوتا تاہم جانور سست اور تھکا ہوا دیکھائی دیتا ہے، دودھ کی پیداوار میں خاطر خواہ کمی اور دودھ اتارنے میں بھی دیر کرتا ہے
- ★ دودھ میں پھٹکیاں بھی موجود نہیں ہوتیں البتہ دودھ کا ذائقہ نمکین ہو جاتا ہے
- ★ اس حالت میں تھن میں ناٹ بن جاتی ہے اور یہ سلسلہ کئی مہینوں یا سالوں تک مخفی ہی رہتا ہے
- ★ بعض اوقات تھن میں سے تیلی لسی یا پیپ نما رنگ کا گاڑھا مواد نکلتا رہتا ہے

## سرف ٹیسٹ کا طریقہ کار

ساڑو کی مخفی حالت کی تشخیص کیلئے سرف ٹیسٹ سب سے سادہ اور سستا طریقہ ہے



- ✱ جانوروں میں مخفی ساڑو کی تشخیص کے لئے ہر پندرہ دن بعد سرف ٹیسٹ ضرور کریں
- ✱ گھر میں عام استعمال ہونے والے سرف کے 2 سے 3 چمچ ایک کپ پانی میں حل کر لیں
- ✱ چار پیالیاں لے کر اس میں ہر تھن سے علیحدہ علیحدہ دودھ کی دھاریں لیں
- ✱ برابر مقدار میں سرف کا محلول اس دودھ میں ڈالیں اور اچھی طرح حل کریں
- ✱ آدھا منٹ تک پیالی کو ہلاتے رہیں



یہاری کا پہلا درجہ (+)	اگر آمیزہ میں چھوٹی چھوٹی سفید بھٹکیاں ہوں
یہاری کا دوسرا درجہ (++)	آمیڑہ گاڑھا/سفید ریشہ دار ہو
یہاری کا تیسرا درجہ (+++)	اگر آمیزہ جیلی کی طرح گاڑھا ہو
جانور یہاری سے محفوظ ہے	اگر دودھ اپنا پتلپن برقرار رکھے

## ساڑو اور سوزش حیوان سے بچاؤ اور روک تھام کے لئے اہم تدابیر



- ✱ ساڑو سے بچاؤ کیلئے دن میں کم از کم دو دفعہ باڑے کی صفائی ضرور کریں اور استعمال ہونے والے برتنوں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں
- ✱ دودھ دوہنے سے پہلے اور بعد میں تھن اور حیوانے کو اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں
- ✱ دودھ مٹھی بند کر کے اور مکمل طور پر دوہیں
- ✱ انگوٹھا بند کر کے دودھ مت دوہیں نیز دودھ دوہنے سے پہلے انگلی سے انگوٹھی یا چھلا وغیرہ اتار دیں
- ✱ بچوں کو دودھ دوہنے سے پہلے دودھ پلائیں
- ✱ دودھ دوہنے کے بعد جانوروں کو کم از کم آدھا گھنٹہ بیٹھنے نہ دیں تاکہ تھن میں دودھ کی نالی بند ہو جائے
- ✱ دودھ دوہنے کے بعد تھنوں کو جراثیم کش محلول میں ڈبوئے سے ساڑو کے امکانات کو خاطر خواہ حد تک کم کیا جاسکتا ہے
- ✱ متاثرہ جانور کو صحت مند جانوروں سے علیحدہ رکھیں اور اس کا دودھ آخر میں دوہیں نیز متاثرہ دودھ کو صاف دودھ سے علیحدہ رکھیں
- ✱ حاملہ جانوروں کو خشک کرنے سے پہلے لمبے عرصے تک اثر کرنے والی اینٹی بائیوٹک تھن میں داخل کریں کیونکہ اس عمل سے آئندہ ساڑو کا خطرہ ٹل جاتا ہے
- ✱ ساڑو اور دوسری جراثیمی بیماریوں کے خلاف مناسب قوت مدافعت کے لئے تمام جانوروں کو متوازن خوراک مہیا کریں
- ✱ جانوروں کی صحت سے متعلق مزید امور کے لئے ماہر ویٹرنری ڈاکٹر سے فوری رجوع کریں

پونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز، لاہور  
فون: 042-37212339 ویب سائٹ: www.aslpdairy.pk

اے ایس ایل پی ڈیری پراجیکٹ