

جانورن جي حفظان صحت

تربيتي ڪتاب



Australian
AID



اي ايس ايل بي، ڊيري پراجيڪٽ

پونيورسٽي آف وئترني اينڊ اينٽيل سائنسز، لاهور

فون: 042-37212339

ويب سائٽ: www.aslpdairy.pk



Australian
AID



اي ايس ايل بي، ڊيري پراجيڪٽ پونيورسٽي آف وئترني اينڊ اينٽيل سائنسز، لاهور

مهاڳ

اي ايس ايل پي. ڊيري پراجيڪٽ آسٽريلوي ۽ پاڪستاني حڪومتن جي وچ ۾ هڪ اهڙو منصوبو آهي جنهن جو مقصد توسيعي سگيا جي ذريعي ننڍي ڊيري فارمرز جي جانورن وڪير جي پيداوار وڌائي ان جي معاشي ۽ معاشرتي حالتن ۾ بهتري آڻي سگهجي. کير جي پيداوار ۾ اضافو صرف انهي وقت ممڪن هوندو جڏهن ڊيري فارمر کي پنهنجي جانورن جي رهائش، خوراڪ، صحت ۽ نسل وڌائڻ جهڙن تمام بنيادي ڪمن جي مڪمل ڄاڻ هجي. هن تربيتي ڪتاب جو مقصد ڊيري فارمرز کي جانورن جي بهتر سار سنڀال جي بنيادي اصولن جي مڪمل آگاهي ڏيڻ آهي ته جيئن في جانور جي سراسري پيداوار ۾ اضافو ٿي سگهي. جنهن سان پاڪستان جي ڳوٺن ۾ غربت جي شرح ۽ گهٽتائي ۽ ماڻهن جي طرز زندگي بهتر بڻائڻ ۾ مدد ملي سگهي. هن تربيتي ڪتاب جي انفراديت هي آهي ته هن ۾ موجود سڄي معلومات مستند ۽ ذاتي تجربن تي ٻڌل آهي جيڪو ڊيري نير کي پراجيڪٽ جي پهرين فيزي جي دوران حاصل ٿيون. هن تربيتي ڪتاب مان نه صرف ڊيري فارمرز پر وليج ويٽرنري ورڪرز، ويٽرنري اسسٽنٽ ۽ ويٽرنري ڊاڪٽر پڻ فائدو حاصل ڪري سگهن ٿا. هن تربيتي ڪتاب کي ڇپائڻ لاءِ اسان آسٽريلوي حڪومت جي بين الاقوامي زرعي تحقيقاتي اداري جا مشڪور آهيون.

ڊيري نير

فهرست

صفحہ	عنوان	نمبر
1	اهميت	1 -
3	صحتمند ۽ بيمار جانور جي سڃاڻپ	2 -
4	جانورن جون اهر وڃندڙ بيماريو	3 -
5	اوه يا تشن جي بيماري	4 -
7	ساماڙو، مهاڙو	5 -
8	گل گهوٽو (گهوگهي جي بيماري)	6 -
11	ڪاري چنگهه يا ست جي بيماري	7 -
12	چڙن مان پڪڙندڙ بيماريون	8 -
14	حفاظتي ٽڪا (ويڪسينيشن)	9 -
17	جانورن ۾ ڪيڙن جو خاتمو	10 -

توسيعي خدمتن کي موثر انداز و سرنجام ڏيڻ جي لاءِ توسيعي
ڪارڪنن کي جانورن جي حفظان صحت متعلق هيلين ڪمن جي
مڪمل آگاهي هجڻ گهرجي .

- ▶ جانورن جو بيماريون، حفاظتي تدبيرون ۽ انهن جو خاتمو
- ▶ تندرست ۽ بيمار جانور جي سڃاڻپ
- ▶ مختلف بيمارين جو علامتون ۽ انهن جي اختلافي سڃاڻپ جي مڪمل آگاهي
- ▶ بيمار جانورن جي سارسنيال ۽ علاج معالجي تي مهارت



اهميت

صحتمند جانورن تي بهتر پيداوار ۽ فائديمند ڊيري فارمنگ جي ضمانت هوندا آهن انهي
حقيقت جي بيش نظر بيمارين کان محفوظ جانور هر ڪامياب ڊيري فارمر جي اولين ترجيح هوندا آهن . عام طور
تي اسان جا ڊيري فارمرز ٺاڻي واري فصلن تي تمام گهڻي توجہ ڏيندا آهن پر جانورن جي صحت جي بنيادي ڪمن
و غفلت ڪن ٿا جيڪو بعد و انهن جو وڏي معاشي نقصان جو سبب بڻجن ٿيون

پرهيز علاج کان بهتر آهي

انهن طريقن و واڙي جي صفائي جو غير مناسب انتظام، حفاظتي ٽڪا تائين تي نه لڳرائڻ، جانورن جي بروقت علاج
و لاپرواهي ۽ متوازن خوراڪ جو استعمال نه ڪرڻ شامل آهي .

حفظان صحت جي لاءِ توسيعي ڪارڪنن جون ذميداريون

اسان جي ملڪ و گورناتي ويترنري وڪرز، ويترنري اسسٽنٽ ۽ ڊاڪٽر حضرات صرف علاج معالجو، حفاظتي
ٽڪا ۽ هٿرادو نسل ڪشي جهڙي خدمتن تائين ئي محدود آهن جڏهن ته منظم توسيعي خدمتن جون مڪمل طور
تي گهٽتائي آهي .
انهي حقيقت کي سامهون رکندي اي ايس ايل پي، ڊيري پراجيڪٽ ويترنري ڊاڪٽرز جي توسيعي تربيت تي
انهي انداز و توجہ ڏي ٿو ته هو علاج سان گڏوگڏ ننڍن ڊيري فارمرز کي بهتر، منظم ۽ جديد طريقن تي تربيت ڏئي
انهن جي معاشي ۽ معاشرتي حالتن و بهتري آڻي سگهجي .

صحتمند ۽ بيمار جانورن جي سڃاڻپ

واڙي ۾ موجود بيمار جانورن جي بروقت سڃاڻپ ڊيري فارمرز جي تمام گهڻن معاشي خرچن کي گهٽ ڪرڻ ۽ صحتمند جانورن کي به بيمارين جي حملي کان محفوظ رکڻ ۾ به مددگار ثابت ٿيندي آهي. انهي ڪري اها ڳالهه انتهائي اهميت جي حامل آهي ته واڙي ۾ موجود تمام جانورن جو صحيح شمار خاص ڪري گاهه ڏيڻ کان پوءِ بغور معائنو ڪيو وڃي.

صحتمند جانور جي سڃاڻپ	بيمار جانور جي سڃاڻپ
آڪيون واضح ۽ چمڪدار هونديون آهن	آڪيون اندر ڊيبل هونديون آهن
جانور پرسڪون ۽ هڪ ئي رفتار ۾ ساهه کڻندو آهي	ساهه کڻڻ ۾ ڏکيائي يا تيزي سان ساهه کڻي ٿو
صحتمند جانور هوشيار، بچست ۽ پنهنجي ماحول ۾ دلچسپي وٺندو آهي	جانور سست ۽ بين جانورن کان ڌار رهڻ پسند ڪندو آهي
صحتمند جانور شوق سان کائي ٿو ۽ کائڻ کانپوءِ دير تائين اوڳر ورائيندو رهي ٿو	کير جي پيداوار تمام گهڻي متاثر ٿيندي آهي
	جانور کائڻ پيئڻ ڇڏي ڏي ٿو ۽ اوڳر به گهٽ ورائي ٿو
	جانورن جي چمڙي خشڪ، ڪردري ۽ بي رونق ٿي ويندي آهي



بروقت سڃاڻپ، موثر علاج

جانورن جي کائڻ پيئڻ، جريب، وات، نڪ ۽ اکين جي رطوبتن جو اخراج، چيشي ۽ پيشاب جو بغور معائنو ڪريو. بيمار جانور جي سڃاڻپ تي انهن کي صحتمند جانورن کان الڳ ڪري انهن جو جسماني گرمي جو درجو ۽ ساهه کڻڻ جي رفتار نوٽ ڪريو. تندرست جانورن جو جسماني گرمي جو درجو، نبض ۽ ساهه کڻڻ جي رفتار هيٺ ڏجن ٿيون:

جانور	گرمي جو درجو (فارن هائيٽ)	نبض (في منٽ)	ساهه کڻڻ جي رفتار (في منٽ)
ڳئون	101.5	48-84	26-50
مينهن	101	40-60	10-30
گهوڙو	100	28-40	10-14
رد	102.3	70-80	16-34
پڪري	102	70-80	16-32

علامتون ظاهر ٿيڻ جي صورت ۾ ماهر ويٽرنري ڊاڪٽر سان فوري رابطو ڪريو

جانورن جو اهم بيماريون

هي هڪ حقيقت آهي ته تندرست جانور ئي ڊيري فارمر جي خوشحالي جا ضامن هوندا آهن پر بدقسمتي سان حفضان صحت جي اصولن ۾ ٿوري لاپرواهي جي ڪري جانور مختلف بيمارين جا شڪار ٿي ويندا آهن. انهن ۾ ڪجهه اهم ترين بيماريون ۽ انهن جو سادو قابل عمل احتياطي تدبيرون هيٺ ڏجن ٿيون.

لٽن يا اوه جي سوچ ساماڙو يا مهاڙو گل گهوٽو (گهوگهو)

ڪاري جنگهه يا ست جي بيماري چچون جو بخار

ٺٺن يا اوهه جي سوچ کان بچاءُ

ٺٺن جي سوچ کي گهڻو ڪري اوهه جي سوچ يا فڪريو چيو ويندو آهي. ٺٺن جي سوچ ورتن ضايع ٿي ويندو آهي جيڪو ڊيري فارمر جي معاشي نقصان جو سبب بڻجي ٿو. ٺٺن جي حملي جو امڪان جانورن جي پيداواري عروج، برسات جي موسم ۾ جڏهن موسمي دٻاءُ وڌيڪ هوندو آهي ۽ ڪنهن بيماري جي نتيجي ۾ جڏهن قوت مدافعت گهٽ ٿي وڃي تڏهن گهڻا هوندا آهن.

ٺٺن جي سوچ ٿيڻ جا اهم سبب

- واڙي ۾ صاف سترائي جو غير مناسب انتظار.
- ٺٺن يا اوهه تي زخمي ۽ ان جي علاج تي توجه نہ ڏيڻ
- خراب هنن ۽ غلط طريقي سان ڏوهائي ڪرڻ
- قرن کي ڏوهائي کان پوءِ کير پيارڻ. • سينور (فئڪس) لڳل خوراڪ جو استعمال ڪرڻ.



ٺٺن جي سوچ جون نشانيون (ظاهري حالت ۾)

- اوهه ۾ اوجھو سوچ، ڳاڙهو ٿي وڃڻ، هٿ لڳائڻ تي گرم ۽ جانور کي سور محسوس ٿيندو آهي
- جانور کي تيز بخار ٿي ويندو آهي ۽ جانور کائڻ پيئڻ ڇڏي ڏيندو آهي
- کير جي پيداوار ۾ گهٽتائي، کير جو ڦٽي وڃڻ ۽ کير ۾ ڳنڍا نظر اچڻ ٿا
- ٺٺن جي سوچ واري جانور جو کير بدبودار ۽ لوتيلو ٿي وڃي ٿو
- بروقت علاج نہ ڪرائڻ جي صورت ۾ ٺٺن جي اندر ناز (مٿيون) ٿي ويندو آهي جنهن جي ڪري هڪ يا هڪ کان وڌيڪ ٺٺن سُڪي ويندا آهن
- اوهه جي حالت ۾ ٺٺن ۾ نازا مٿيون ٿي ويندو آهي ۽ اهو سلسلو گهڻن مهينن يا سالن تائين لڪيل رهي سگهي ٿو
- ڪڏهن ڪڏهن ٺٺن مان چڙي لسي يا گند جهڙو گهاٽو مواد نڪرندو رهندو آهي

ٺٺن جي سوچ جون نشانيون (اندروني يا لڪيل حالت ۾)

- ٺٺن يا اوهه جي ظاهري بناوٽ وڪار تبديلي نظر نٿي اچي
- جانور صحتمند نظر ايندو آهي پر کير جي پيداوار ۾ ڪوت ۽ کير لاهڻ ۾ دير ڪندو آهي
- کير ۾ ڦٽيون موجود نہ هونديون آهن پر کير جو ذائقو لوڻيانو ٿي ويندو آهي
- اهڙي حالت ۾ ٺٺن ۾ نازا مٿيون ٿي ويندو آهي ۽ اهو سلسلو گهڻن مهينن يا سالن تائين لڪيل رهي سگهي ٿو
- ڪڏهن ڪڏهن ٺٺن مان چڙي لسي يا گند جهڙو گهاٽو مواد نڪرندو رهندو آهي

سرف ٽيسٽ جو طريقو

ٺٺن جي سوچ جي اندروني حالت ڏسڻ جي لاءِ سرف ٽيسٽ سڀ کان سادو ۽ سستو طريقو آهي



- جانورن ۾ ٺٺن جي سوچ جي سڃاڻپ جي لاءِ هر پنڊرنهن ڏينهن بعد سرف ٽيسٽ ضرور ڪريو
- گهرو ۽ عام استعمال ٿيندڙ سرف جا 2 کان 3 ڇمچ هڪ ڪوپ ۾ حل ڪريو
- چار بياليون کڻي ان ۾ چارئي ٺٺن مان ڌار ڌار کير جا ڳوڙا (سيڙهون) وٺو
- هڪجيتري مقدار ۾ سرف وارو پاڻي ان چارئي پيالن ۾ وجهي اڌ منٽ تائين هلائيندا رهو.

جيڪڏهن کير ۾ ننڍيون ننڍيون ڦٽيون هجن	بيماري جو پهريون درجو (+)
جيڪڏهن کير ڳوڙا يا سفيد ريشيدار هجي	بيماري جو ٻيون درجو (++)
جيڪڏهن کير جي لي وائوگهاتر هجي	بيماري جو ٽيون درجو (+++)
جيڪڏهن کير ڇڏو ۽ پنهنجي اصل شڪل وڃي	جانور بيماري کان محفوظ آهي

ٺٺن جي سوچ کان بچاءُ جا اهم اپاءَ

- ٺٺن جي سوچ کان بچاءُ جي لاءِ ڏينهن ۾ گهٽ ۾ گهٽ ٻه دفعه واڙي جي صفائي ضرور ڪريو ۽ کير جي لاءِ استعمال ٿيندڙ ٺانورن جي صفائي جو خاص خيال رکو
- کير جي ڏوهائي کان پهريان ۽ پوءِ ٺٺن ۽ اوهه کي چڱي طرح ڏوڏي خشڪ ڪري وٺو
- قرن کي ڏوهائي کان پهريان کير پياريو
- ڪڏهن به آنگو بند ڪري ڏوهائي نہ ڪريو ۽ کير جي مڪمل ڏوهائي ڪريو
- کير جي ڏوهائي کان پوءِ جانورن کي گهٽ ۾ گهٽ اڌ ڪلاڪ ڏوهائي کان پوءِ ٺٺن کي جيورن کان بچاءُ واري دوا لڳائڻ سان ٺٺن جي ويهڻ نہ ڏيو نہ جيئن ٺٺن ۾ کير واري نالي بند ٿي وڃي
- سوچ واري بيماري ۾ گهٽتائي آڻي سگهجي ٿي
- بيماري واري جانور کي صحتمند جانورن کان الڳ رکيو ۽ ان جي ڏوهائي آخر ۾ ڪريو
- ڏکي جانور کي خشڪ ڪرڻ کان پهريان گهڻي وقت تائين اثر رکندڙ اينٽي بائيوٽڪ ٺٺن ۾ داخل ڪريو اهڙي عمل سان ديامن بعد ٺٺن يا اوهه جي سوچ جو خطرو گهٽجي وڃي ٿو



ڏينهن تائين رهندو آهي جنهن جي نتيجي ۾ جانور
ڪمزور ۽ هيٺو ٿي ويندو آهي

ساماڙي يا مهاڙي کان بچاءَ جي لاءِ اهر آباڻ

- سڀني جانورن کي مهاڙي کان بچاءَ جا حفاظتي ٽڪا بروقت لڳرايو. هي حفاظتي ٽڪا هميشه متعلق ذريعن کان حاصل ڪريو ڳهڻو ڪري سال ۾ ٻه دفعو (فيبروري، مارچ ۽ سيپٽمبر، آڪٽوبر) ۾ حفاظتي ٽڪا لڳرايو
 - بيمار جانورن کي تندرست جانورن کان قورن الڳ ڪريو ۽ ان جي ڏوهائي آخر ۾ ڪريو
 - علائقي ۾ ساماڙي يا مهاڙي جي حملي جي صورت ۾ جانورن کي چرائي جي لاءِ ٻاهر نه موڪليو ۽ هڪ ئي نلاڙ يا وهندڙ پاڻي ۾ نه وڃڻ ڏيو
 - متاثر ٿيل جانورن جي واڙي ۾ جراثيم ڪش دوائن جو استعمال ڪريو نئون جانور خريد ڪرڻ جي صورت ۾ انهي کي ٻين جانورن کان هڪ مهيني تائين الڳ رکڻ ۽ انهي ڳالهه جي تسلي ڪري وٺو ته انهي کي ساماڙي يا مهاڙي جي بيماري نه آهي
 - متاثر جانورن جي وات ۽ ڪرن تي هڪ سيڪڙو پوٽاشيوم پرميگنيٽ (ڳاڙهي ڍوا) سان ڏوٽو يا بورڪ ايسڊ ۽ گليسرين ملائي وات جي ڦلڪڻن تي لڳايو
 - متاثر جانورن کي نمر ۽ هضر ٿيڻ واري خوراڪ ڪارايو
- علامتون ظاهر ٿيڻ جي صورت ۾ ويجهي ويترنري ڊاڪٽر سان رابطو ڪريو

ساماڙو يا مهاڙو

ساماڙو يا مهاڙو هڪ وچزندڙ بيماري آهي جنهن سان نه صرف جانورن جي کير ۾ گهٽتائي ٿيندي آهي پر انهن جي صحت تي به ناڪاري اثر ٿين ٿا جيڪو ڊيري فارمز جي لاءِ زبردست معاشي نقصان جو سبب آهي.

ڦهلجڻ جو سبب

مهاڙي جي ڦهلجڻ جو سبب هڪ خاص قسم جو وائرس آهي جيڪو متاثر جانورن جي جسر مان نڪرندڙ ڇيڻي ۽ رطوبتن جي ذريعي خارج ٿئي ٿو مثال طور وات مان نڪرندڙ گڱ. کير ۽ ڦلڪڻن جي ڀس انهي بيماري جي ڦهلجڻ جو سبب بڻجن ٿا. ڊيسي نسل جي بدران پسر نسل جي ڳئون ۾ مهاڙي جو خطرو گهڻو هوندو آهي.

علامتون



- جانور سست ٿي وڃي ٿو. کاڌو گهٽ کائي ٿو ۽ اوڳر به گهٽ ورائي ٿو
- تيز بخار ٿي وڃي ٿو ۽ جسماني گرمي پد 104 کان 106 فارن هائيت تائين پهچي وڃي ٿو
- متاثر جانور جي زبان، تالو، ڪرن ۽ اوهه تي ڦلڪڻا بڻجي ويندا آهن
- جانور جي وات مان گڱ وهندي رهندي آهي ۽ جانور منڍڪائي هلندو آهي
- کير جي پيداوار ۾ تمام گهڻي گهٽتائي اچي ويندي آهي
- موت جي شرح تمام گهٽ هوندي آهي پر مرض جو حملو 15 کان 20

گل گھوتو

گل گھوتو هڪ موت مار ۽ وچونڌڙ مرض آهي جيڪو اسان جي ملڪ ۾ عام آهي . هي هڪ خاص قسم جي بيڪٽريا جي ڪري ٿيندو آهي . هي عام طور تي درياء جي ويجهي ميداني علائقن ۽ زير زمين پاڻي جي بلند سطحن وارن علائقن ۾ ملي ٿي . انهي کان سواءِ شديد موسمي حالتن، ناقص خوراڪ ۽ خشڪ سالي کان پوءِ جانورن جي قوت مدافعت گهٽ ٿيڻ جي ڪري به انهي بيماري جو خطرو وڌي ويندو آهي . هي بيماري عام طور تي ٻه سال کان گهٽ عمر جي جانورن ۾ گهڻو حملو ڪندي آهي جيڪو اڪثر موثر ۽ بروقت علاج نه ڪرائڻ جي ڪري جانورن جي موت جو سبب بڻجي وڃي ٿي .

علامتون

- جانور سست ٿي ويندو آهي ۽ انهي کي چڪ گهٽ لڳندي آهي
- تيز بخار سان گڏ گلي ۽ زبان تي سوج ٿي ويندي آهي
- زبان جو رنگ نيرو ٿي ويندو آهي
- وات ۽ نڪ مان پاڻي وهندو آهي
- نيبض ۽ ساهه کڻڻ جي رفتار تيز ٿي ويندي آهي



- گلي ۾ شديد سوج جي ڪري ساهه کڻڻ ۾ تڪليف ٿيندي آهي ۽ گلي مان خرخرهت جي آواز ايندي رهندي آهي فوري ۽ موثر علاج نه ڪرائڻ جي ڪري ساهه گهٽجڻ جي صورت ۾ جانور جي موت به واقع ٿي سگهي ٿي

گل گھوتو کان بچاء لاءِ اهم مشورا

- سال ۾ ٻه دفعو (مئي، جون ۽ نومبر، ڊسمبر) ۾ بيماري کان بچاء جا حفاظتي ٽڪا لڳرايو
- بيمار جانور کي تندرست جانور کان الڳ ڪريو
- واڙي ۾ جراثيم ڪش دوائن جو استعمال ڪندا رهو
- تيز بخار جي صورت ۾ جانور جي مٿي تي پاڻي هاريو ۽ ماهر ويترنري ڊاڪٽر سان فوري رابطو ڪريو
- مثل جانور کي وڏو کڏو کوٽي دفنايو

ڪاري چنگهه يا ست جي بيماري (بليڪ ڪوآٽر)

ڪاري چنگهه يا ست جي بيماري هڪ وچونڌڙ بيماري آهي جيڪو هڪ خاص قسم جي بيڪٽريا جي ڪري ٿيندي آهي. هي بيماري عام طور تي نيمر بهاري وارن علائقن ۾ ملي ٿي پر جانورن جي چرپر جي ڪري به هي ميداني وارن علائقن جي جانورن ۾ به منتقل ٿي سگهي ٿي. بروقت ۽ موثر علاج نه ڪرائڻ جي صورت ۾ جانورن جي موت جو سبب بڻجي سگهي ٿي. انهي بيماري جا امڪانات 2 سالن جي عمر جي جانورن ۾ وڌيڪ ملن ٿا.

علامتون

- جانور انتهائي سست ٿي ويندو آهي ۽ ان سان گڏوگڏ ڪاٺ پيشن ڇڏي ڏيندو آهي
- تيز بخار ٿي ويندو آهي ۽ جسماني گرمي جو درجو 104 کان 106 فارن هائيٽ تائين پهچي ويندو آهي
- ڪنڌ يا ران تي شديد سوج ٿي ويندي آهي
- سوج واري جڳهه جو گرم هجڻ، هٿ لاهڻ سان جانور سور محسوس ڪري ٿو ۽ چرچر جو آواز به ٻڌڻ ۾ اچي ٿي
- سور جي ڪري جانور هلڻ ۾ تڪليف محسوس ڪري ٿو



ڪاري چنگهه يا ست جي بيماري کان بچاءَ جا اپاءَ

- بيماري کان بچاءَ جا حالات حفاظتي ٽڪا اپريل جي مهيني ۾ لڳايو
- متاثر جانور کي تندرست جانور کان الڳ رکيو
- نون خريد ڪيل جانورن کي هڪ مهيني تائين باقي جانورن کان الڳ رکيو ۽ حفاظتي ٽڪا لڳايو
- جانورن جي جسر تي زخار اچڻ جي صورت ۾ باقائديگي سان جراثيم ڪش دوا ضرور لڳايو
- علامتون ظاهر ٿيڻ جي صورت ۾ ماهر ويترنري ڊاڪٽر سان رابطو ڪيو

چچڙن مان ڦهلجندڙ بيماريون

چچڙ جانورن جي جسر تي هوندا آهن. هي نه صرف جانورن جو رت چوسي انهن کي ڪمزور ڪندا آهن پر مختلف قسمن جون بيماريون ڦهلائڻ ۽ پيداوار ۾ نمايان گهٽتائي جو سبب بڻجن ٿا. انهن جو حملو خاص طور تي ولائيتي ۽ پسر نسل جي گئون وڳهڻو هوندو آهي. پاڪستان ۾ مارچ کان آڪٽوبر تائين جو موسم چچڙن جي پرورش جو موسم سمجهيو ويندو آهي. چچڙن جي ڪري جانورن ۾ هيٺيون بيماريون ڦهلجنديون آهن:

گاڙها پيشاب (زهر باد) ڳوڙهين جو بخار

علامتون

• جانور کائڻ پيشڻ ڇڏي ڏي ٿو • تيز بخار ۽ ساه کڻڻ جي رفتار وڌي ويندي آهي

- جسور ورت ۽ پاڻي جي گهٽتائي ٿي وڃي ٿي
- رت وارا پيشاب ورت جانور جي پيشاب جو رنگ ڳاڙهان مائل ٿي ويندو آهي
- جسور موجود ڳوڙهين ورت سوج ٿيڻ ڳوڙهين جي بخار جي هڪ نمايان علامت آهي
- عار طور تي انهن پنهنجي بيمارين ورت اينٽي بائيوٽڪس جو اثر نٿو ٿئي



چچڙن جي بخار کان بچاءُ جا اهم اپاءَ

چچڙ واري جي آس پاس جي جڳهين، ديوارن، آهون ۽ ڪائين جي چيرن ورت ملن ٿا. انهي ڪري انهن چيرن کي بند ڪري ۽ واري ورت چچڙ مار دوائن جو باقائدهگي سان هر مهيني چچڙ مار دوائن کان بچاءُ جي لاءِ انتهائي اهم آهي. چچڙن جي شديد حملي جي صورت ورت جانورن کي چچڙ مار دوائن سان وهنجاريو. وڌيڪ معلومات جي لاءِ پنهنجي ماهر ورتنري ڊاڪٽر سان رابطو ڪريو

حفاظتي ٽڪا (ويڪسينيشن)

پاڪستان ورت سال وچ ۾ وچ ۾ بيمارين سان ڪيترن ئي قيمتي جانورن جو ضيان ٿي ويندو آهي. انهن مرضن کان صحتياب ٿيڻ کان پوءِ متاثر جانورن جي صحت ۽ پيداواري صلاحيت برقرار رهي انهي کان سواءِ علاج معالجي تي ٿيڻ وارن خرچا به ڊيري فارمريز تي به اضافي بوجھ جو سبب بڻجن ٿا. بروقت ۽ موثر علاج جي منصوبابندي انهن ممڪن معاشي نقصانن کان بچي سگهجي ٿو.

حفاظتي ٽڪا

حفاظتي ٽڪا مختلف وچ ۾ بيمارين جي حملي کان بروقت بچاءُ جو بهترين ذريعو آهن. هي ٽڪا هميشه تندرست جانورن کي ئي بيماري کان بچاءُ جي لاءِ لڳايا ورتن ٿا. حفاظتي ٽڪا جانورن جي جسور ورت انهي مرضن جي خلاف قوت مدافعت پيدا ڪندا آهن. هتي هي ڳالهه به قابل ذڪر آهي ته حفاظتي ٽڪا مرضن جي علاج لاءِ نه پر صرف ۽ صرف مرض جي حملي کان بچاءُ جي لاءِ لڳايو ويندو آهي.

حفاظتي ٽڪن جي لاءِ هدايتون



- ٽڪن کي هميشه 4 ڊگري سينٽي گريڊ تي ريفريجريٽر ورت محفوظ ڪري رکو
- انهن کي سج جي روشني يا گرمي کان محفوظ رکو ۽ هڪڙي جڳهه کان ٻي جڳهه تائين منتقل ڪرڻ جي لاءِ ٿرماس يا برف جو استعمال ڪريو

حفاظتي ٽڪن جي غير فائديمند ٿيڻ جا سبب

- حفاظتي ٽڪن کي مدي خارج ٿيڻ کان پوءِ استعمال ڪرڻ
- ٽڪن کي محفوظ ڪرڻ ۽ انهن جي نقل وحرڪت ۾ غير ذميداري جو مظاهرو ڪرڻ
- لپيل تي لڳل هدايتن جي مطابق حفاظتي ڪورس مڪمل نه ڪرائڻ
- گهريل مقدار کان گهٽ حفاظتي ٽڪن جو استعمال ڪرڻ
- غير مطلع ذريعن کان حاصل حفاظتي ٽڪن جو استعمال



• استعمال کان پهرين لپيل تي ڏنل هدايتن کي ضرور پڙهو ۽

بوتل کي چڱي طرح هلاڪي استعمال ڪريو

• حفاظتي ٽڪا لڳرائڻ کان پهرين جراثيم ڪش دوائن جو استعمال نه ڪريو

• هي ٽڪا هميشه گهريل مقدار ۾ ڇمڙي هي هيٺيان لڳايو

• نندن ڦرن کي 2 هفتن جي عمر کان پوءِ حفاظتي ٽڪا لڳايو

• گهريل نتيجن کي حاصل ڪرڻ جي لاءِ لپيل تي ڏنل هدايتن جي مطابق حفاظتي ٽڪن جو مڪمل ڪورس ڪرايو

مدو	ٽڪا لڳرائڻ جو وقت	مرض
6 مهينا	مئي، جون ۽ نومبر، ڊسمبر	گل گهوٽو
6 مهينا	فيبروري، مارچ ۽ سيپٽمبر، آڪٽوبر	مهاڙو يا ساماڙو
هڪ سال	اپريل	ڪاري جنگه (بليڪ ڪوائٽ)

حفاظتي ٽڪا هميشه متعلق ذريعن کان حاصل ڪريو ۽ وڌيڪ معلومات لاءِ پنهنجي ويجهي ماهر ويترنري ڊاڪٽر سان رابطو ڪريو



جانورن ۾ ڪيڙن جو خاتمو

اسان جي ملڪ ۾ جانورن جي گهڻي تعداد مختلف قسمن جي ڪيڙن جا شڪار هندا آهن. ڪيڙا جانورن جي پيداواري صلاحيت کي متاثر ڪن ٿا ۽ مختلف بيماريون ڦهلائي ڏيري فارمزر جي مالي نقصان جو سبب بڻجن ٿا انهي ڪري ڪيڙن تي بروقت قابو پائي جانورن جي صحت ۽ پيداوار کي بهتر بڻائي سگهجي ٿو.

ڪيڙا جانورن جي اهو قسم آهن جيڪي زنده رهڻ جي لاءِ ٻين جاندارن جا محتاج هوندا آهن. ڪيڙن جي حملي جو خطرو گهڻو ڪري خشڪ خوراڪ کائڻ وارن، چرائي تي وڃڻ وارن ۽ ننڍي عمر جي جانورن ۾ ٿيندو آهي. ڪيڙا عام طور تي ٻن قسمن جا ٿيندا آهن:

اندروني ڪيڙا

اندروني ڪيڙا

هڪ محتاط اندازي جي مطابق 1 سال کان گهٽ عمر جي جانورن ۾ اندروني ڪيڙن جي ڪري موت جي شرح 30 کان 35 سيڪڙو تائين آهي. انهن ڪيڙن جو حملو خزان (نومبر، ڊسمبر) ۽ برسات (جولاءِ، آگسٽ) جي موسم ۾ گهڻو هوندو آهي. اندروني ڪيڙن جي مختلف قسمن جي تفصيل هيٺ ڏجي ٿي:

اندروني ڪيڙن جو علامتون

جيري جا ڪيڙا	ڦٽڙن جا ڪيڙا	بيت ۽ آندڻ جا ڪيڙا
<ul style="list-style-type: none"> جانورن ۾ ڪير جي پيداوار شديد متاثر ٿيندي آهي جائز جي هيٺيان ۽ اڳئين نتڻن جي وچ ۾ (جهالرتي) سوڄ ٿي ويندي آهي اکين ۾ پڇون پئجي وينديون آهن شديد حملي جي صورت ۾ اوجھو موت به واقع ٿي ويندي آهي 	<ul style="list-style-type: none"> ساهه جي نالي ۾ سوڄ ۽ جانور ساهه کڻڻ ۾ تڪليف محسوس ڪندو آهي ڪنگهه ٿي ويندي آهي جانور منهن (وات) کولي ۽ اڪڙ ڪري ساهه کڻندو آهي نڪ مان گهاٽي سنگهه رهندي آهي ننڍن ڦرن ۾ نمونيا ٿي ويندي آهي 	<ul style="list-style-type: none"> جانور خوراڪ گهٽ کائيندو ۽ آهستي آهستي ڪمزور ٿيندو ويندو آهي ۽ پيداوار به گهڻي متاثر ٿي ويندي آهي ننڍا ڦر مٿي کائڻ لڳندا آهن ۽ انهن جو بيت لٽڪي ويندو آهي چمڙي خشڪ ۽ ڪردري ٿي ويندي آهي شديد حملي جي صورت ۾ جانورن ۾ بدبودار تپڪ (دست) لڳي ويندي آهي



ٻاهريان ڪيڙا

ٻاهريان ڪيڙا جانورن جي چمڙي تي رهي ڪري رت چوسين ٿا ۽ انهي دوران اهي جانورن ۾ تمام گهڻيون موتمار بيماريون ڦهلائڻ جو سبب بڻجن ٿا. ان ۾ چچڙ، جوڻن، مڪيون ۽ مچر وغيره شامل آهن:

ڪيڙن کان بچاء لاءِ اهم مشورا

- روزانو ڏينهن ۾ ٻه دفعه واڙي جي صفائي ضرور ڪريو ۽ پاڻي بيهڻ نه ڏيو
 - ننڍن ڦرن کي لازم ۾ هڻڻ مهينن بعد ۽ وڏن جانورن کي ضرورت مطابق ڪيڙا مارڻ دوائون ماهر ويترنري ڊاڪٽر جي مشوري سان پياريو
 - اگر علامتي ۾ سهولت موجود هجي ته لپبارٽري مان چيڙي جي ٽيسٽ ضرور ڪرايو
 - واڙي جي ديوارن يا چت تي ڪو سوراخ يا چير نه هڻڻ گهرجي جتي هي باهريان ڪيڙا آڻا ڏئي سگهن يا لڪي سگهن
 - واڙي ۾ هر مهيني باقائدي سان چڙ مارڻ دوائن جو اسپري ڪرايو
 - وقت به وقت واڙي ۾ چوني جو چڙ ڪاڻو ڪرايو
 - گاهه جي صفائي جو خاص خيال رکڻ ڪيڙا گاهه کي مٽي کان بچايو
 - ڪيڙا مارڻ دوائون هميشه تبديل ڪري پيارڻ گهرجن ته جيئن ڪيڙا هڪ ئي دوا جي خلاف قوت مدافعت حاصل نه ڪري سگهن
 - پاڻي جي حوض ۾ به چن استعمال ڪريو ته جيئن جيوڙن کان بچي سگهجي
 - جانورن تي چڙن جي شديد حملي جي صورت ۾ چڙي تي چڙ مارڻ دوائون لڳرايو
- وڌيڪ مشوري جي لاءِ پنهنجي ويجهي ويترنري ڊاڪٽر سان رابطو ڪريو



هي ڪيڙا خاص طور تي سنهي چڙي وارن جانورن مثال

طور تي ولايتي ۽ پسر نسل جي گئون کي شديد متاثر ڪن ٿا . باهريان ڪيڙا گهڻو

ڪري ڪنن، اوهه ۽ تنگن جي وچ ۾ ڏسڻ ۾ اچن ٿا .

علامتون :

- جانور بيچيني واري حالت ۾ هوندو آهي
- رت جي گهٽتائي جي ڪري جانور انتهائي ڪمزور ۽ هيٺو ٿي ويندو آهي
- چڙي خشڪ ۽ ڪردري ٿي ويندي آهي
- جانورن جي پيداواري صلاحيت ۾ گهٽتائي اچي ويندي آهي
- چڙي تي سوراخ ٿي ويندا آهن ۽ ان تي زخمي ٿي پوندا آهن
- چڙن جي ڪري پيشاب ۾ رت ۽ ڳوڙهين جو بخار جهڙيون موتمار بيماريون لڳي سگهن ٿيون

