



Aik Saath



ایک ساتھ
'Together'

قڙي يا پلورونمونیا

(سي سي پي پي)

تعارف


قڙي يا پلورونمونیا بڪرين ۽ رڍن جي قڙن تي اثر ڪندڙ خطرناڪ وبائي بيماري آهي، اها بيماري وڏي تعداد ۾ بڪرين ۽ رڍن کي بيمار ڪندي آهي، 60 کان 100% فيصد بيمار جانور مري وڃن ٿا. هي بيماري عام طور تي بڪرين ۾ گهڻي ٿيندي آهي پر رڍن کي پڻ بيمار ڪري ٿي. قڙي يا پلورونمونیا انسانن ۾ نه وڃندي آهي.

قڙي ٿيڻ جا سبب



هي ساه ڪڙڻ جي سرشتي واري بيماري بيڪٽيريا (جراثيم) جي ڪري ٿئي ٿي. جنهن جو نالو مائيڪوبلازما ڪيپريڪيولم ۽ ذيلي ذات ڪيپريمونیا آهي.

بيماري جون علامتون



- هي بيماري هيٺ ڏنل مختلف قسمن جي علامتن جي ڪري ٿئي ٿي
- جانور تمام جلد متاثر ٿي سگهن ٿا، بيماري ۽ ڪجهه ٻين نشانين جي ڪري
- جانور 1 کان 3 ڏينهن ۾ مري وڃي ٿو.
- جيڪڏهن جانور جلدي نه ٿا مرن ته اهي ڪاٺ بند ڪندا آهن، ڪمزور، اداس، بيهوش، تيز بخار، سخت ڪنگهه ۽ ساه چڪي ڪندا آهن.
- ڊگهي عرصي کان متاثر ٿيل جانورن ۾ گهٽ واضح علامتون نظر اينديون آهن، جن ۾ ڪنگهه، چيٽيل هيڊو - سائوزڪام ۽ ويساه شامل آهن.

جانورن ۾ قڙي ٿيڻ جا سبب

- جانور ٻين متاثر ٿيندڙ جانورن سان سڌي رابطي جي ڪري بيمار ٿي ٿو ڇو جو بيمار جانور جي نچ مان نڪتل بيڪٽيريا صحتي جانور جي ساه ۾ هليا وڃن ٿا.
- بيمار جانورن ۾ ڊگهي عرصي تائين معمولي نشانين ڏسڻ ۾ اينديون آهن جنهن جي ڪري قڙي جي سڃاڻپ ڪرڻ ۾ تمام گهڻي مشڪل ٿيندي آهي.
- جانور عام طور تي ڪنهن ٻئي متاثر ٿيل جانور سان رابطي ۾ اچڻ کانپوءِ 6 کان 10 ڏينهن بعد بيماري جون علامتون ڏيکارڻ شروع ڪندا آهن
- جانورن ۾ جيڪڏهن غذايت جي ڪمي هجي يا گاڏي جو ڊگهو سفر هجي يا برساتن جا شروع وارا ڏينهن هجن ته جانور بيمار ٿي سگهن ٿا



سي سي پي پي جي سجاڻپ ڪيئن ڪجي؟

- ڦٽڙي کي هميشه شڪ ۾ رکڻ گهرجي، جيڪڏهن هڪ ئي وقت ۾ گهڻن/ وڌيڪ جانورن کي ساهه واري بيماري سان گڏ ڪنگهه، پاڻي وارو زڪام، ساهه ڪڍڻ ۾ تڪليف ۽ اڇانڪ موت ٿئي ته اها بيماري ڦٽڙي ٿي سگهي ٿي.
- مردار جانور جو ڦٽڙ ٿلهو، وزني ۽ ڪارو هوندو آهي، ڦٽڙن جي پنهي حصن ۾ خراب مواد بيٺل هوندو آهي ۽ جيڪڏهن ڦٽڙ ڦاٽل هجي ته خراب هيڊو مواد وهندو رهندو آهي.
- ويٽرنري ڊاڪٽر بيماري جي سجاڻپ لاءِ مثل جانورن مان ڦٽڙن جا نمونا، صحت مند ۽ بيمار پڪري يا ري مان رت جا نمونا ڪڍي ليباريٽري مان تصديق ڪرائيندا آهن.

ڦٽڙي جهڙيون ٻيون بيماريون

- ٽٽي ماتا يا ڪاتا (بي بي آر): تيز بخار، وڌيڪ تعداد ۾ موت، وات ۾ ڦلڪڻن جي ڪري سور، اکين ۾ پاڻي، جلاب ٿيندا آهن.
- ساهه ۾ تڪليف ڪندڙ ٻيون بيماريون

جيڪڏهن توهان کي ڦٽڙي واري بيماري جو شڪ آهي ته ڇا ڪندا؟

جيڪڏهن توهان جو جانور ڦٽڙي واري بيماري ۾ مبتلا ٿئي ٿو ته پوءِ توهان پنهنجي ڳوٺ يا يونين ڪائونسل ۾ موجود ويجهي سرڪاري يا پرائيوٽ جانورن جي ڊاڪٽر يا ڊسپينسري اسسٽنٽ سان رابطو ڪندا.

علاج

جيڪڏهن جانورن کي بيمار ٿيڻ کان پهرين اينٽي بايوٽيڪس جو مڪمل ڪورس هڪ هفتي تائين روزانو لڳائي ته علاج اثراتو ٿي سگهي ٿو ۽ ان سان گڏ پنهنجي مقامي جانورن جي ماهرن کان به صلاح ضرور وٺو.

بيماري جي ڦهلجڻ تي ضابطو

- وبا بيماري جي دوران، بيمار جانورن کي صحتمند کان ڌار ڪجي ته جيئن بيمار جانور جي بهتر سنڀال ۽ خوراڪ حاصل ڪري سگهن.
- بيماري کي پڪيڙ کان بچڻ لاءِ صحتمند جانورن کانپوءِ بيمار جانورن کي ڪارايو. بيمار جانورن کي هٿ لاهڻ کانپوءِ پنهنجا هٿ چڱي طرح ڌوئجن.
- بيمار جانورن کي خوراڪ ڏيڻ کانپوءِ استعمال ڪيل آورا يا ٻيا ٿانو گهر ۾ موجود صابن يا بليچ سان ڌوئي ڇڏيو.



بيماري روڪڻ جا احتياطي

- جانورن کي ڦٽڙي جي ويڪسين لڳي سگهجي ٿي. ماهر ويٽرنري ڊاڪٽر سان رابطو ڪرڻ ضروري آهي.
- جانورن کي معياري پڙي يا جاءِ تان خريد ڪرڻ گهرجي. خريد ڪيل جانورن کي صحتمند جانورن کان الڳ ڪجي.
- ماهر ڊاڪٽر جي چڪاس ۽ جانور جي صحتمند ٿيڻ کان پوءِ سڀني کي گڏ رڳجي.