



Aik Saath



ایک ساتھ
'Together'

Creep Feeding

کریپ فیڈنگ

تعارف

پکري ۽ ري جا قرڙا اضافي ۽ سني خوراڪ ڪارائتو ما فائدا حاصل ڪري سگهن ٿا. جنهن جي ڪري قرڙن جي اموات ۾ گهٽتائي ۽ انهن جي جسماني واڌويجهه ممڪن ٿي سگهي ٿي. پاڳيا پڻ ڪريپ فيڊنگ جي ذريعي پکري ۽ ري جي قرڙن کي سني ۽ اضافي خوراڪ مهيا ڪن ۽ وڏن جانورن کي انهن کان پري رکن. ڪريپ فيڊنگ روزاني خوراڪ (ڪير، چرائي، ساڻو گاهه ۽ ٻيون خوراڪ) ۾ اضافي خوراڪ آهي.

ڪريپ فيڊنگ جا فائدا



پکري جا قرڙا واڙي جي اندر خوراڪ کائيندي

- ڪريپ فيڊنگ حيران ڪندڙ طريقو آهي جنهن ۾ نه صرف پکري، ري جي قرڙن ۾ موت جي شرح ۾ گهٽتائي ٿئي ٿي پر قرڙن ۾ بيمارين سان وڙهڻ لاءِ قوت، مدافعت به وڌائي ٿي. سنڌ صوبي جي ڳوٺن ۾ جتي ڪريپ فيڊنگ ڪئي وئي آهي، اتي 17 فيصد مرڻ جو شرح ڏنو ويو ۽ جتي عام روايتي طور تي 33 فيصد مرڻ جو شرح ڪريپ فيڊنگ کان علاوه جانور ۾ ڏنو ويو.
- ڪريپ فيڊنگ بچت جو هڪ ذريعو آهي ڇاڪاڻ ته واڙي جي رڪارٽن جي ڪري وڏو جانور نه اندر رسائي ڪري سگهي ٿو نه ئي اندر موجود خوراڪ کائي سگهي ٿو.



ڪريپ فيڊنگ سسٽم جي مثال

- ڪريپ فيڊنگ جي ذريعي پکري ۽ ري جا قرڙا آساني سان چرائي لاءِ ڪجهه عرصي ۾ تيار ٿي ويندا آهن.
- پکري ۽ ري جا قرڙا ننڍي عمر ۾ وڪڻي ۽ سٺو ٺاڻو ڪمائي سگهجي ٿو.

ڪريپ فيڊنگ ڪڏهن شروع ڪئي وڃي؟

ڇهن (6) مهينن کان ننڍن قرڙن کي ڪريپ فيڊ ڏني وڃي. تن (3) هفتن جا قرڙا آساني سان ڪريپ فيڊ کائڻ شروع ڪري ڇڏيندا آهن. اگر پکري ۽ ري جا قرڙا شروع ڏينهن ۾ اندر خوراڪ نه کائين ته توهان قرڙن جي ماء کي ڪريپ فيڊنگ واري جاءِ جي اندر رسائي ڏيو ڇاڪاڻ ته ماء ڪجهه ڏينهن ۾ قرڙن کي خوراڪ کائڻ سيکاري ڇڏيندي.

ڪريپ فيڊنگ جي واڙي ڪيئن ٺاهجي؟

- ڪريپ فيڊنگ جو مقصد اهو آهي ته اها جاءِ جنهن ۾ ننڍن قرڙن کي وڃڻ ۾ آساني ۽ وڏن جانورن کي انهيءَ جاءِ ۾ وڃڻ کان روڪڻ، هڪ بهترين واڙي ۾ 3 کان 4 وچوٽيون هجن جنهن ۾ وچوٽي 4 انچ (10 سينٽي ميٽر) هجي. اهي وچوٽيون قرڙن



حکومت سندھ
Government of Sindh





واڙي ناهڻ جو مثال

جي لاءِ هونديون جنهن مان اهي آساني سان گذري سگهن. اگر وڏا جانور وچوئين مان گذري وڃن ته پوءِ وچوئين کي اڃان گهٽايو وڃي.

◆ ڪريپ فيڊنگ جي واڙي تمام سستي شين سان ٺهندي آهي. جهڙوڪ ڪاڻ يا بانس.

◆ پڪرين ۽ رڍن جي ڦرڙن کي ڪريپ فيڊ جي واڙي ۾ اچڻ وڃڻ ۾ آساني هجي ته جيئن اهي ڏينهن جي گهڻي عرصي ۾ اهي خوراڪ آساني سان کائي سگهن.

ڪريپ فيڊ ۾ ڪهڙي ۽ ڪيتري خوراڪ ڪارائجي؟

ڪريپ فيڊ 3/1 حصو سني خوراڪ ۽ 3/2 حصو گهٽ غذائيتي خوراڪ کي پاڻ ۾ سني نموني سان ملايو (مڪس) ڪيو. ڪوشش ڪيو ته مٿي ڏنل لسٽ مان سني خوراڪ کي چونڊيو جيڪو بازار مان آساني سان ملي سگهي. 200 کان 250 گرام اندازي موجب هڪ پاءُ خوراڪ هر جانور کي روزانو ڏجي، خوراڪ کي ڪريپ فيڊنگ جي واڙي ۾ اندر رکو جنهن ۾ وڏن جانورن جي رسائي نه هجي. اڌ پائونڊ هڪ بالغ ماڻهو جو پيريل هٿ جيترو، پر اهو ضروري آهي ته ڪارائين کان پهرين خوراڪ جو وزن ڪيو ۽ واڙي ۾ تازي پاڻي جي فراهمي لازمي آهي.

مثال طور تي سني ۽ گهٽ غذائيت واري خوراڪ هيٺ ڏجن ٿيون

گهٽ غذائيت واري خوراڪ 33 %		سني معياري وڌيڪ غذائيت واري خوراڪ 67%	
Chickpea straw	چئن جو پوسو	Berseem/clover	برسيير
Peanut straw	ڪاچن جو پوسو	Chickpea grain	چٽا
Groundnut straw	اخروٽ جو پوسو	Cotton trash*	ڦٽي جو پورو
Local grass (fresh or hay)	تازو ۽ سنڪل گاه	Cottonseed cake*	ڪڙ
Millet hay	پاجهري جو گاه	Cow pea forage'	چئن جو گاهه
Napier grass (fresh or hay)	ڪمند جو گاه	Groundnut cake	ڪاچن جو ڪيڪ
Oat forage' (fresh or hay)	جَو	Jantar/Sesbania	جنتر
Rice straw	پراڙ	Jawar/sorghum grain	دائيدار جوار
Sorghum forage' (fresh or dry)	جوار جو گاه	Lucerne/alfalfa	لوسن
Wheat forage' (fresh)	ڪڻڪ جو گاه	Millet forage' (fresh)	پاجهڙي
Wheat straw or hay	بوه	Millet grain	جَو
		Oat grain	پوسو
		Wheat bran	ڪڻڪ
		Wheat grain*	

✚ اوچتي نئين خوراڪ ڪارائڻ سان ڦرڙن ۾ هاضمي جي خرابي ٿي سگهي ٿي. تنهنڪري هفتي جو هڪ ڇڏي يعني ڏينهن هڪ (سني) هر جانور کي ڪارايو. خوراڪ جي ٻڌايل مقدار روزانو ڪارائجي.

✚ Forage جو مطلب ٻوٽي جو ٿڙ ۽ ان جا پن آهن.

ڦرڙن جي تعداد موجب خوراڪ جي مقدار ڪابه هڪ پيمائش استعمال ڪيو جيڪا اوهان کي آسان لڳي.

ڪريپ فيڊ جي مقدار (روزاني بنياد تي) صرف هڪ ڪالڙ جي چونڊ ڪيو			ڪريپ فيڊ لاءِ ڦرڙن جو تعداد
ڪلو گرام	پائونڊ	مٺي پيريل	
0.5	1	3	2
0.75	2	5	4
1.25	2.5	8	6
1.5	3.5	11	8
2	4.5	13	10