



دست يا جلاب

Aik Saath



ايڪ ساٿھ
'Together'

تعارف

دست هڪ عام ۽ مهانگو مسئلو آهي جيڪو هر عمر جي ٻڪري ۽ ريڙي کي متاثر ڪري سگهي ٿو. دست معدي جو مسئلو آهي جنهن ۾ جانورن جون پولٽيون نرم ۽ پائيدار ٿي وينديون آهن، ڪڏهن ڪڏهن رت يا بلغم جهڙا داغ لڳل هوندا آهن. انهي جا ڪيترائي مختلف سبب آهن. انهي سان گڏ موت جو سبب بڻجي سگهن ٿا. جانورن کي دستن جهڙيون هلندڙ بيماريون واڌ جي شرح گهٽائڻ وارو نقصان به ڪري سگهن ٿيون.

نشانيون

جانور وقفي وقفي کانپوءِ نرم پٽڙو ڇيڻو ڪري ٿو، جيڪو جانورن جي جسم جي چوڌاري يا تنگن ۽ پچ جي هيٺيان جمع ٿي ويندو آهي. دستن سان گڏ رت اچڻ جي شڪايت به هوندي آهي. جيتوڻيڪ جانورن کي قدرتي طور تي نرم دست ٿي سگهن ٿا جڏهن ته سرسبز خوراڪ کائڻ سان به هلاڪا دست ٿين ٿا، دستن واري بيماري جي ڪري وزن گهٽائڻ، بڪ جي گهٽتائي، سستي، ذهني پریشاني يا بخار جو سبب بڻجندي آهي. مخصوص نشانيون جي لاءِ هيٺ ڏنل چارٽ کي چيڪ ڪريو.

جانورن ۾ دستن جي بيماري ڪيئن ٿئي ٿي؟

ٻڪرين يا ريڙن ۾ دست هيٺين ٻڌايل ڪنهن به ڳالهه جي ڪري ٿي سگهن ٿا.



- **ڪيڙن وارا انفیکشن:** ”ڪيڙا“ ڪورڊبيني سان ڏسجندڙ جيوڙا آهن جيڪي جانورن ۾ ساڳي چراگاهه واري جاءِ تي چرڻ جي ڪري جانورن وچ ۾ منتقل ٿيندا آهن. چراگاهه ڪيترن ئي مهينن جا خراب ٿي سگهن ٿا، خاص ڪري ٿڌي يا سخت موسم واري وقت ڪيڙا گهٽ تعداد ۾ نقصان پهچائيندا آهن، پر وڏي قسم جا انفیکشن خاص طور تي جوان ڦرڙن يا نسل وارن جانورن ۾ سخت جلاب ۽ بيماري جو سبب بڻجندا آهن. ٻڪري يا ريڙي پڻ گڏجي هلندڙ جانور جهڙوڪ. ٻڪري، ريڙي، گئون يا اٺ جي جيوڙن مان متاثر ٿي سگهن ٿا.
- **جراثيمن سبب انفیکشن:** ٻڪري يا ريڙي ۾ آلوده خوراڪ يا پاڻي جي ڪري جراثيم ٿي سگهن ٿا. صحتمند جانور قدرتي طور تي بغير نقصان جي جراثيم پاڻ سان گڏ کڻي هلندا آهن. پر خوراڪ جي غير مناسب استعمال، گاڏين ۾ اچڻ وڃڻ يا خوراڪ ۾ اوچتو تبديلي جي ڪري بيماري ۾ مبتلاءَ ٿي سگهن ٿا.
- **خوراڪ جي اوچتو تبديلي:** چرائي واري گاهه جو جلدي وڌڻ، ساڻو گاهه، نمڪيات واري خوراڪ جهڙوڪ ڪڻڪ يا جو يا خاص ٻوٽن جو استعمال ڪرڻ سان دست ٿي سگهن ٿا.

دست يا جلاب واري بيماري جو معائنو



- جلاب جو اصل سبب لازمي طور تي سمجهڻ گهرجي ڇو جو انهيءَ سان صحيح علاج ڪري سگهجي ٿو: اهو شايد عام معلومات يا دستن جي سببن، مختلف عمر جي جانورن يا مختلف انتظامي حالتن جي ڪري ٿي سگهي ٿو.
- جيڪڏهن جانور ڪنهن به علاج سان صحيح نه ٿئي ته جانورن جي ڊاڪٽر يا حيواني صحت وارو عملدار کي جانورن جي چڪاس ڪرائجي، جانورن جون پولٽيون/ دست يا رت جا نمونا چڪاس ڪرائجن ته جيئن جيوڙن يا جراثيمن جي خبر پئجي سگهي.

علاج ۽ احتياط

- عام علاج جو خلاصو هيٺ ڏنل چارٽ ۾ آهي. اهو ضرور ڏسجي ته جانورن کي علاج ۾ دوا جو صحيح وزن ۽ وقت تي علاج ٿي وڃڻ گهرجي.
- جانورن جي ڦرڙن کي شديد دستن جي صورت ۾ روزاني بنياد تي هڪ ڪوپ جيتري پاڻيءَ ۾ ضمني رطوبت ڏينهن ۾ چار دفعا پيارجي.
- جيڪڏهن جانور لپٽي پئي يا ويهي رهي ته ان کي چانوءَ / صاف جڳهه، تازو پاڻي ۽ خوراڪ فراهم ڪئي وڃي.
- جانورن جي پوئين حصي کي ضرور صاف رکيو وڃي ته جيئن وڏي مک / مڪي جي حملي کان بچائي سگهجي.
- جيڪڏهن دست جاري رهن ٿا ته پنهنجي ويجهي جانورن جي ڊاڪٽر سان صلاح ڪريو.

انفيڪشن يا ڦهلاءَ تي قابو ڪرڻ / صفائي

- ✓ گندا گهر ۽ جانورن جون ڪوئيون بيماري جي جراثيم کي ڦهلائي سگهن ٿا. انهيءَ لاءِ انهن کي صاف رکڻ ضروري آهي.
- ✓ نئي ڄاول ٻار کي پس پيارڻ سان قوتِ مدافعت وڌي ٿي جيڪا بيماري يا انفيڪشن سان سڌي ريت وڙهڻ ۾ ڦڙ جي مدد ڪري ٿو.
- ✓ ڪڏهن به نئي قسم جي خوراڪ کي ٻئي خوراڪ سان جلدي نه بدلائجي، جيتوڻيڪ ٿوري ٿوري ڪري 4 کان 7 ڏينهن ۾ بدلائي سگهجي ٿي.
- ✓ نشاستي واري خوراڪ جهڙوڪ. (ڪڻڪ، جوءَ ۽ چانور) 50 گرام شروع واري ڏينهن ۾ جانورن کي ڪارائجي، پوءِ آهستي آهستي هفتي يا ٻن هفتن ۾ خوراڪ کي گهرج مطابق وڌائجي.
- ✓ دستن ۾ مبتلا جانورن کي ٻين صحتي جانورن کان الڳ رکڻ گهرجي جيستائين اهي صحتياب نه ٿين. بڪرين ۽ ڍڻن جي ڦڙن کي بيماري جي صورت ۾ پنهنجي ماءُ سان گڏ ۽ ٻئي ڏڻ کان پري ٻڌجي.
- ✓ ڪجهه جراثيم جيڪي جانورن ۾ دست پيدا ڪن ٿا اهي انسان کي به نقصان پهچائي سگهن ٿا. انهيءَ لاءِ بيمار جانورن ۾ هٿ وجهڻ کانپوءِ پنهنجي هٿن، پيرن ۽ پاتل بوتن کي صابن ۽ صاف پاڻيءَ سان ڌوڻ گهرجن.

تصوير	انفيڪشن يا ڦهلاءَ جا سبب	علاج	عام ڪارڻ	دستن جا قسم	جانورن جا قسم
	جانورن کي گندي جاءِ تي رکيو ويو آهي، واڙي کي روز صاف نٿو ڪيو وڃي، جانورن کي گهٽ جاءِ تي رکيو ويو آهي يا ننڍن ۽ وڏن جانورن کي گڏ رکيو ويو آهي	اسڪور-ايڪس يا انهيءَ جهڙي ڪا ٻي دوا 12 ملي ليٽر هر 10 ڪلوگرام وزن تي جانور ٽي ڏينهن ۾ 3 دفعا 3 ڏينهن پياريو	بيڪٽيريا ۽ ڪاڪسيڊيا جراثيم جي ڪري آڻڻ ۾ ڦهلاءَ	پاڻي ۽ چوٽ ساوا بڊبودار	گهر ۾ بيٺل ڍڻ ۽ بڪري جا وارا ڦڙا
	چراگاه واري جاءِ تي گاه جي گهٽتائي يا جانور اتي چرائي ڪن جتي پهريان ئي دستن جي بيماري ۾ مبتلا جانور چرائي ڪري چڪا هجن.	مفت خور جراثيم يا جيوڙن (اڀني پيراسائيت / اڀني هيلمنٽ) کي مارڻ لاءِ هيٺ ڏنل دوائن جو ڪوبه هڪ طريقو پيارڻ وارو يا سُئي واري جي چونڊ ڪريو. • 1% Ivermectin 0.4 ملي ليٽر بڪري ۽ 0.2 ملي ليٽر ڍڻ کي چمڙي ۾ سُئي هڻجي. • 1.5 Levamisole ملي ليٽر بڪري ۽ 1 ملي ليٽر ڍڻ کي پيارجي. • 4 Albendazole ملي ليٽر بڪري ۽ 2 ملي ليٽر ڍڻ کي پيارجي.	مفت خور جيوڙا	دستن ۾ ڍڻ ۽ ڦڙا يا وڏا جانور گهٽ هوندي پر ڪارا ۽ نيم پاڻيائي ٿيندا آهن	چرائي تي ويندڙ دستن ۾ ڍڻ ۽ ڦڙا يا وڏا جانور گهٽ هوندي پر ڪارا ۽ نيم پاڻيائي ٿيندا آهن

Aik Saath

ڪي ساٿه
Together