



Aik Saath



ایک ساتھ

'Together'

اسہال / دست

تعارف:

اسہال ایک عام اور مہنگا مسئلہ ہے جو ہر عمر کے بکری اور بھیڑوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ اسہال معدے کا ایک مسئلہ ہے جس میں جانور کا فضلہ نرم اور پانی بن جاتا ہے۔ بعض اوقات خون یا بلغم بھی اس میں موجود ہوتا ہے۔ اس کی بہت سی مختلف وجوہات ہیں۔ اس سے موت بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سے بچنے والے جانور کو کم قوت مدافیت اور بڑھوتری میں کمی کا سامنا ہو سکتا ہے۔

جانوروں میں اسہال کی علامات:

فضلہ سخت سیاہ مٹر کے دانے جیسی شکل سے نرم مادے میں منتقل ہو جاتا ہے اور جسم سے دور کرنے کے بجائے فضلہ خارج ہونے والی جگہ اور پچھلی ٹانگوں پہ جمع ہو جاتا ہے جس میں ریشا / بلغم بھی موجود ہوتا ہے۔ اگرچہ، قدرتی طور پر بھی جانور کا فضلہ حرا گھانس کھانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ بیماری سے ہونے والے دست / اسہال وزن میں کمی، بھوک میں کمی، سستی اور ڈپریشن یا بخار کا سبب بنتے ہیں۔

جانوروں میں دست / اسہال کی وجوہات:

- پیٹ کے کرموں / کیڑوں کا انفیکشن: کرم بہت چھوٹے کیڑے (جو عام آنکھ سے نادیکھے جاسکتے ہوں) ہوتے ہیں جو جانوروں میں ایک ہی گھاس پہ چرائی سے پھیلے ہیں۔ گھاس / چارہ میں انفیکشن کئی مہینوں تک رہ سکتا ہے۔ خاص کر ٹھنڈے اور نم موسم میں۔ کم تعداد میں موجود کرمے / کیڑے نقصان دہ نہیں ہوتے زیادہ تعداد خاص کر چھوٹے بچوں اور نسلی افزائی کے لیے پالے جانے والے جانوروں میں شدید دست / اسہال اور بیماری کا باعث بنتے ہیں۔ بکریوں اور بھیڑوں میں کرمے دوسری بکریوں، بھیڑوں، گائے، بھینسوں اور اونٹوں سے پھیل سکتے ہیں۔



- جراثیموں سے ہونے والا انفیکشن: بکریوں اور بھیڑوں میں گندے / خراب چارے اور پانی کی وجہ سے انفیکشن ہو سکتا ہے۔ تندرست جانوروں میں قدرتی طور پر جراثیم پائے جاتے ہیں جو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے جب تک جانور وافر مقدار میں خوراک ناکھانے، سفر یا خوراک میں اچانک بدلاؤ کی وجہ سے ہونے والے تناؤ کا شکار نہ ہوں۔

- خوراک میں اچانک ہونے والی تبدیلیاں: اس میں خوراک میں تیزی سے حرے چارے میں بڑھوتری، حرے خوراک، زیادہ انرجی / طاقت والی خوراک جیسا کہ گندم یا جو، کچھ پودے کھانا شامل ہیں۔

دست / اسہال کی تشخیص:

- دست کی وجہ کو صحیح طریقے سے تشخیص کرنا بہت ضروری ہے تاکہ صحیح علاج کا استعمال کیا جائے: اس کی تشخیص مختلف عمر کے جانوروں میں دست کی عام وجوہات کی جانکاری اور دیکھ بھال کی صورت حال کو مد نظر رکھتے ہوئے کی جاسکتی ہے۔

- اگر جانور میں علاج کے متوقع نتائج ناپائے جائیں تو وٹرنری ڈاکٹر یا جانوروں کے ہیلتھ ورکر جانوروں کی جانچ کر سکتے ہیں۔ یا فضلہ کے سمپل / نمونے لے سکتے ہیں؛ کرموں ان کے انڈے یا جراثیموں کو دیکھنے کے لیے۔



اسہال کی عام وجوہات اور علاج:

- عام طور پر کیے جانے والے علاج نیچے ٹیبل میں بیان کیے گئے ہیں۔ دیحان رہے کہ جانور کو صحیح مقدار میں صحیح عرصے کے لیے وہ علاج مہیا کیا جائے
- چھوٹے جانور کو شدید دست / اسہال ہونے کی صورت میں اضافی پانی پلائیں۔ ایک کپ پانی دن میں چار بار روزانہ
- گرے ہوئے یا پیٹھے ہوئے جانوروں کو سایہ دار جگہ پر تازہ پانی اور خوراک مہیا کریں۔
- جانوروں کو مکھیوں کے حملے سے بچھانے کے لیے ان کے سچی کے حصے کو صاف کریں۔
- اگر دست مستقل رہیں تو مقامی وٹرنری ڈاکٹر سے رابطہ کریں

بچاؤ اور احتیاتی تحفظ:

- رہنے کی گندی جگہوں اور باڑوں سے انفیکشن پھیل سکتا ہے۔ ان جگہوں کو صاف رکھنا اہم ہے۔
- نوزائیدہ بچوں میں انفیکشن کے خلاف قوت مدافیت پیدا کرنے کے لیے پیدائش کے فوراً بعد بہلی پلانے کو یقینی بنائیں
- چارے کو کبھی بھی اچانک نابدلیں۔ چارے سے سات دنوں میں آہستہ آہستہ نئی خوراک کو جانوروں کے چارے میں متعارف کروائیں
- گندم، جو، چاول وغیرہ کی شروعات 50 گرام ایک دن ایک جانور کے حساب سے دیں۔ پھر آہستہ آہستہ مطلوبہ مقدار دو ہفتوں میں بڑھائیں
- اسہال والے جانور کو باقی جانوروں سے الگ رکھیں جب تک بیمار جانور ٹھیک نہ ہو جائے۔ بیمار بھیڑ یا بکری کے بچے کو اس کی ماں کے ساتھ اور باقی جانوروں سے دور رکھیں۔
- بھیڑ بکری میں اسہال کے سبب بننے والے کچھ جراثیم انسانوں کو بھی متاثر کر سکتے ہیں۔ اس لیے بیمار جانور کو سنبھالنے کے بعد ہاتھ پاؤں اور جوتوں کو اچھی طرح صابن اور پانی سے دھوئیں۔

| تصویر | انفیکشن کے خطرات | علاج | اسہال کی قسم | عام وجہ | اسٹاک کلاس |
|---|---|---|--|--|---|
|  | جانوروں کو گندی جگہ پر رکھنا، باقائمانگی سے صفائی نہ کرنا، جانوروں کی تعداد کے حساب سے ناکافی جگہ، چھوٹے بڑے جانوروں کا ایک ساتھ ہونا | اسکور۔ اسکوئر X Liquid روزانہ دن میں دو مرتبہ 3 دن کے لئے 12 ایم ایل 10 کلو وزن کے حساب سے | پانی نمائش | بیکٹیریا یا لکسیڈیا یا بدبودار، اور سبز درجے سے ہونے والا آنتوں کا انفیکشن | بکری اور بھیڑ کے چھوٹے بچے زیادہ تر جو گھر پر رکھے جاتے ہوں |
|  | چھوٹی گھاس چرنا ایسی جگہ جہاں جانوروں کی تعداد زیادہ ہو یا / اور اسہال والے جانور نے چرائی کی ہو۔ | ایک بار کرم کش دوا حسب ضرورت پلائی جائے یا تجزیقہ لگا یا جائے ■ آیور میکسٹا (Ivermectin) کھال میں لگائی جائے ✓ 0.4 ایم ایل بکری کے لیے - 0.2 ایم ایل بھیڑ کے لیے ■ لیو امیزول (Levamisole) پلائیں ✓ بکری 1.5 ایم ایل - بھیڑ 1 ایم ایل ■ البینڈازول (Albendazole) پلائیں ✓ 14 ایم ایل بکری کو - 2 ایم ایل بھیڑ کو تمام ڈوز 10 کلو گرام وزن کے حساب سے دیں | اسہال عام طور پر کم بدبودار مگر سیاہ اور شہم نامع ہوتا ہے۔ | پیٹ کے کرمے / کیڑے | چرائی کرنے والے بھیڑ بکریاں اور بچے |

