



مهاڙو يا سامارو

ايف ايمر ڊي (FMD)

تعارف

سامارو يا مهاڙو هڪ وچونڌڙ بيماري آهي جنهن ۾ ڪر وارا جانور مٿل ڳئون، مينهن، ري ۽ ٻڪري وغيره متاثر ٿين ٿا. هي بيماري ڪير ۽ گوشت جي وڌيڪ پيداوار حاصل ڪندڙ جانورن ۾ اهم رڪاوٽون پيدا ڪندي آهي.

نشانيون

هن بيماري ۾ مبتلا جانور هيٺيون نشانيون ظاهر ڪن ٿا. ڳئون ۽ مينهن کان ري ۽ ٻڪري ۾ وڌيڪ نشانيون ٿين ٿيون.



- بخار
- ذهني دٻاءُ
- ڪاٺ پيٽڻ ڇڏي ڏيڻ يا بڪ نه لڳڻ
- هلڻ گهمڻ ۾ منڊڪاٺ
- وات، منهن، پيرن ۽ ٽڻن تي ڦلڪوڪڻا نڪرڻ
- جانورن جي منهن مان گگ جو وهڻ
- جانور جو بنا ڪنهن نشاني جي اوچتو مري وڃڻ

سامارو يا مهاڙي واري بيماري ڪيئن پکڙجي ٿي؟

- متاثر جانور جي ساهه، وات مان نڪرندڙ گگ، ڪير، پيشاب ۽ نڪ مان نڪرندڙ مواد جي ذريعي هي بيماري پکڙجي ٿي.
- ٻيا جانور به هنن سان متاثر ٿي سگهن ٿا جهڙوڪ: متاثر ٿيل جانورن سان سڌو سئون رابطو يا آلودگي وارو کاڌو ۽ پاڻي استعمال ڪرڻ
- آلودگي وارا ڪپڙا، گندا پير، خراب جڳهه يا پجرا ۽ گاڏيون
- بغير ڪنهن نشاني ظاهر ڪرڻ کان پهريان جانور ڪيترن ئي ڏينهن تائين متاثر هوندو آهي
- واضح نشانيون ڏسڻ کانپوءِ جانور هفتن يا مهينن تائين بيمار رهي سگهن ٿا.

سامارو جي تشخيص

- سامارو يا مهاڙي واري بيماري جو شڪ تڏهن ٿي سگهي ٿو جڏهن جانورن، ٻڪرين، ري ۽ مينهن ۾ نشانيون ظاهر ٿين.
- متاثر جانورن جي رت ۽ ڦلڪوڪڻن جا نمونا بيماري جي تصديق ڪري سگهن ٿا.



جيڪڏهن توهان کي ساماڙي واري بيماري جو شڪ آهي ته ڇا ڪندا؟

جيڪڏهن توهان جو جانور ساماڙي واري بيماري ۾ مبتلا ٿئي ٿو ته پوءِ توهان پنهنجي ڳوٺ يا يونين ڪائونسل جي ويجهي جانورن جي ڊاڪٽر يا سرڪاري مال واري ڊسپينسري اسسٽنٽ سان رابطو ڪندا.

علاج



- پيرن ۽ وات تي ڳڙن لاءِ جراثيم ڪش جهڙوڪ آئيوڊين، پوٽاشيم پرميگنيٽ، سوڊيم ڪاربونيٽ ۽ گلاسيرين ملائي ڪري لڳايو.
- پڪ ڪيو ته جانورن کي پاڻي ۽ نرم خوراڪ جي رسائي آساني سان آهي، ۽ انهن کي ڪارائتو لاءِ ڪوشش ڪريو.
- دوا تي لکيل هدايتن مطابق 5 ڏينهن تائين ڏينهن ۾ هڪ ڀيرو اينٽي بايوٽيڪس جهڙوڪ پينسيلين يا آڪسائيٽيٽراسائڪلين سان علاج ڪريو.

انفيڪشن تي ضابطو / صفائي



- ساماڙي واري بيماري مان متاثر ٿيل جانورن کي صحتمند جانورن سان رابطي ۾ نه اچڻ ڏيو.
- آخري ڏينهن تائين متاثر جانورن جي کاڌ خوراڪ ۽ علاج جو خيال ڪريو.
- صحتمند جانورن کي هٿ لڳائڻ کان اڳ هٿ، لباس ۽ پيرن کي ڍڪيو ۽ گرم پاڻي جي استعمال يا ڊس انفېڪشن جهڙوڪ سٽرڪ ايسڊ سان انفېڪشن کان پاڻ کي بچايو وڃي.
- متاثر ٿيل جانورن کي منتقل يا وڪرو نه ڪيو وڃي.

احتياط

- ساماڙي واري بيماري ۾ متاثر ٿيل جانور کي پهريان ٽڪو لڳائي بيماري کي روڪڻ گهرجي.
- جانورن کي ترجيحي طور 1 مهيني جي دوران گهٽ ۾ گهٽ 2 وزن ويڪسين هٽڻ گهرجن.
- هڪ ٽڪو جانورن کي انفېڪشن جي خلاف 6 مهينن تائين بچائيندو آهي.

