



Australian Aid



منہ کھر بیماری

FOOT AND MOUTH DISEASE (FMD)

تعارف:

منہ کھر کی بیماری، کھروالے جانوروں جیسا کہ بھیڑ، بکریوں کی وباً بیماری ہے۔ یہ دودھ اور گوشت کی بہترین پیداوار حاصل کرنے میں بڑی رکاوٹ ہے۔

منہ کھر سے متاثرہ جانوروں میں علامات

منہ کھر بیماری سے متاثرہ جانوروں میں مندرجہ ذیل علامات ظاہر ہوتی ہیں، بھیڑ بکری میں اکثر ہلکی علامات ظاہر ہوتی ہیں بانسبت گائے بھیں کے۔



- بخار
- سستی
- بھوک کام لگانا / کھانے کی چاہتنہ ہونا
- انگر اکر چلانا / لکھڑا پن
- کھروں کے درمیان اور ارد گرد کی جلد پر چھالے، زخم یا ان سے پانی بہنا (تصویر دیکھیں)
- منہ اور زبان پر چھالے
- نوذ اسیدہ نپچے اچانک بنا کسی علامت کے مرکستے ہیں

منہ کھر کیسے پھلتی ہے؟

متاثرہ جانور اپنی سانس، تھوک / رال، دودھ، پیشاب، فحلے اور مٹی کے ذریعے نقیش پھیلاتا ہے۔

دوسرے جانور مندرجہ ذیل ذراائع سے متاثر ہو سکتے ہیں

- متاثرہ جانور سے برادر است رابطے سے
- آلوہ پانی چارے اور فرش سے
- آلوہ کپڑوں، جوتوں، آلوہ عمارت اور گاڑیوں سے
- جانور خود علامات ظاہر کرنے سے پہلے کئی دن سے نقیش سے متاثر ہوتا ہے۔
- جانور جب علامات ظاہر کرنا چھوڑ دیتا ہے اس کے بعد ہفتوں سے مہینوں تک اس بیماری کا نقیش جانور میں رہتا ہے۔

منہ کھر کی تشخیص



- منہ کھر کا اندیشہ تب ہوتا ہے جب بہت سارے جانور بیشمول بھیڑ، بکری، گائے، بھیں اس بیماری کی علامات ظاہر کرتے ہیں
- اس بیماری کی تصدیق خون کے نمونے اور متاثرہ جانور کے زخموں سے لیے گئے نمونوں کے ٹیسٹ سے کی جاتی ہے۔



حکومت سندھ
Government of Sindh



جانوروں میں منہ کھر ہونے کی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟

- اگر آپکے جانور میں منہ کھر کا شے ہے تو پھر اپنے گاؤں یا یو نین کو نسل میں قربی گور ٹسٹ کر لاؤ اسٹاک ڈسینسری کے وٹرزی ڈاکٹر یا سسیمیٹ کوفون کریں

علاج



- پاؤں اور منہ پر ہونے والے زخموں پر نرمی سے اینٹی سپیٹک جیسے آئیودین (iodine) پوتاشیم پرمیگنیٹ (Sodium Carbonate) (سوڈیم کاربونیٹ) (Potassium Permagnet) اور گلیسرین کا استعمال کریں
- اس بات کو تین بنائیں کہ جانوروں کو پانی اور نرم کھانے تک آسانی سے رسائی حاصل ہو اور انہیں چارہ کھانے کے لیے بڑھاوا دیں
- لیبل ہدایت کے مطابق اینٹی بائیو نکس جیسا کہ پینیسلین (Penicillin) یا آکسیتھیکس (Oxytetracycline) کے ساتھ دن میں ایک بار روز نہ پانچ دن تک علاج کریں

روک تھام

- منہ کھر ایک وباً یہاری ہے۔ متاثرہ جانوروں کو صحت مند جانوروں سے رابطے میں نہ آنے دیں۔
- دن کے آخر میں متاثرہ جانوروں کو کھانا خلاںیں اور ان کا علاج کریں
- انفیشن کے پھیلاو کو روکنے کے لیے تدرست جانوروں کو سنبھالنے سے پہلے ہاتھوں لباس اور جوتوں کو گرم صابن والے پانی یا جراشیم کشوں جیسا کہ سڑک ایڈ کے استعمال سے جراشیم سے پاک کریں۔
- متاثرہ جانوروں کو ایک سے دوسری جگہ منتقل نہ کریں اور ناپیش

بچاؤ



- جانوروں کو انفیشن ہونے سے قبل ان کو حفاظتی ٹیکے / ویکسین لگا کر منہ کھر سے بچایا جاسکتا ہے۔
- جانوروں کو کم از کم ایک ماہ کے وقت سے دودفعہ ویکسین کرنی چاہیے۔
- ویکسین کا ایک ڈوض جانوروں کو لگ بھگ چھ ماہ تک بچاتا ہے۔
- منہ کھر کے علاج کے لیے استعمال ہونے والے اینٹی سپیٹک اور گلیسرین کی مثال۔

