



چچڙن جو بخار

تعارف

چچڙو اُهي باهريان مفت خور ڪيڙا آهن جيڪي مختلف جانورن جو رت چُوسي جيئرا رهندا آهن. اهي سڌي طرح جانورن کي متاثر ڪندا آهن ۽ خاص طور تي پيشاب ۾ رت اچڻ (Babesiosis) ۽ چچڙن جي بخار (Theileriosis) وارن انفڪشن کي منتقل ڪندا آهن.

نشانيون

چچڙو اڪثر ڪري جانورن جي جسم تي ظاهر هوندا آهن. جڏهن اهي پهريان چمبڙندا آهن ته اُهي شايد سڌا ۽ ڳاڙهي ناسي رنگ جا هوندا آهن. جڏهن اهي رت چوسيندا آهن ته اهي تمام وڏا ٿي ويندا آهن ۽ اڪثر نيرا پورا ۽ گول ٿي ويندا آهن.



گهڻي تعداد ۾ ڪيڙن لڳڻ جا نقصان

- رت جي گهٽتائي
- وزن ۾ گهٽتائي
- ڪير جي پيداوار گهٽجڻ
- بخار ٿيڻ
- وزن وڌائڻ ۾ ناڪامي

چچڙن واري بيماري جي جانچ

چچڙن کي ظاهري اکين سان ڏسي سگهجي ٿو. چچڙن جي چڪاس ڪرڻ لاءِ، پچ جي هيٺيان، بغل يا ڳچي ۽ تنگن جا هيٺيان حصا ڏسڻ گهرجن.

چچڙن جي تشخيص

- ماده چچڙو گاه يا مختلف جڳهين تي بيضا ڏينديون آهن. جيڪي بيضا پڇي ڪري ننڍڙا چچڙو پئدا ڪن ٿا. مختلف قسمن جا چچڙو مختلف جڳهين تي بيضا لاهن ٿا.
- جانور چرائي ڪرڻ دوران يا گهر ۾ اچڻ دوران ننڍڙن چچڙن کان متاثر ٿيندا آهن.
- ڪجهه قسمن جا چچڙو پنهنجي سڄي زندگي هڪ جانور تي گذاريندا آهن پر ٻيا جيئن جيئن وڏا ٿيندا آهن تيئن هڪ جانور کان ٻئي جانور ۾ منتقل ٿيندا رهن ٿا.

علاج



چچڙن جي گهٽ تعداد جي موجودگي کي علاج جي ضرورت نه هوندي آهي. چچڙن جي وڏي تعداد سان متاثر ٿيندڙ جانورن کي سڻي يا قوهارو / صاف ڪرڻ واري ڪيميڪل ذريعي علاج ڪري سگهجي ٿو. اهڙو طريقو چونڊيو جنهن سان جانورن جي گهڻي تعداد جو علاج ٿي سگهي ۽ ٻيون سهولتون ۽ دوائون آساني سان واپرائي سگهجن. دوائن تي

لکيل سڀني هدايتن تي عمل ڪريو، انهيءَ ڪري جوڪجهه دوائون ڍڪين يا کير ڏيندڙ جانورن ۾ استعمال نه ٿيون ڪري سگهجن.

انجڪشن يا سڻي:

انجڪشن آرميڪٽين 1 ملي ليٽر 50 ڪلو گرام جسماني وزن جي حساب سان چمڙي جي هيٺيان لڳائجي.

قوهاڙو يا ڪيميائي مادو هٽڻ:

- سائپر ميٽرن (مثال طور: سائپرڀين، ايڪٽوفيلين): 1 ليٽر پاڻي ۾ 1 ملي ليٽر دوا ملائجي يا ڳارجي.
- ڪيميائي مادي کي ملائڻ وقت دستانا پايو ۽ جڏهن جانورن تي لڳايو ته گهٽ فاصلو رکجي. پيئڻ جي پاڻي وارن جاين جهڙوڪ: واه يا ڪينال ۾ ڪيميائي مادو نيڪال نه ڪجي.

احتياطي تدابير



- قوهاڙو جانورن ۾ محدود ۽ غير هوادار جڳهين تي استعمال نه ڪجي.
- جڏهن جانور اجايل هجي يا گرمائش ۾ هجي ته جانور کي نه وينجارجي.
- کاڌ خوراڪ يا پيئڻ جي پاڻي کي اسپري سان خراب نه ڪريو.
- 3 مهينن کان گهٽ عمر وارن ڦرڙن کي اسپري نه لڳايو.
- ٽڪو کير ڏيڻ يا حامله جانورن کي لڳائڻ کان احتياط ڪريو.

قدرتي طور تي ڇڙ هٽائڻ:

- ڪڪڙيون ۽ ٻيا گهريلو پکي ڇڙ جو شڪار ڪندا آهن، تنهن ڪري اهي جانورن جي چوڌاري ڇڙن جو بار گهٽائڻ ۾ ڏاڍو فائدو ڏيندا آهن.

گهريلو ٽوٽڪن سان ڇڙ هٽائڻ:

- 2 پيالون اڇو سرڪو ۽ 1 پيالي پاڻي شامل ڪري آرن ۽ واڙي جي چوڌاري ڇڙ ڪيو.

ڇڙن لاءِ بندوبست ۽ ضابطو

هيٺيان طريقا ڇڙن لاءِ حڪمت عملي ۽ قابو ڪرڻ ۾ مدد ڏين ٿا

- هلڪو ٻرندڙ ڪچري جو دوٺهون واڙي جي پٽين ۾ موجود ننڍن سوراخن جي ويجهو خارج ڪرڻ سان ڇڙن کي هٽائڻ ۾ مدد ملندي آهي.
- ساون گاهن جي پنن ۽ ڪاٺ جي ٻور کي واڙي مان ڪڍڻ گهرجي ڇاڪاڻ ته ڇڙ اتي رهن ٿا.
- هٿرادو طريقي سان جانورن جي جسم تان ڇڙن کي هٽ سان ڦيرائي ۽ چڪي هٽائجي.
- وڏي پيماني تي خراب وٽاڻ يا واڙي کي ٽرائيڪلورفان (مثال طور: ٽرائيڪلورفان دوائن ۾ ٽيگافون، ايڪٽوفون ۽ سيگوان شامل آهن)

استعمال ڪرڻ جو طريقو: 1 ليٽر پاڻي جو 1.5 گرام ٽرائيڪلورفان ملائڻ گهرجي.

احتياط: نشاندهي ٿيل سڀني هدايتن تي عمل ڪريو، پاڻي يا خوراڪ کي خراب نه ڪيو. انسانن کي ڪيميائي مادي جي رابطي ۾ نه آڻيو.