



چیپڑوں کا حملہ - (Tick Infestation)

تعارف:

چیپڑوں کی کثیرے ہیں جو جانوروں کے خون پر لپٹتے ہیں جو کہ جانوروں کو برداشت بھی متاثر کرتے ہیں اور ان میں سسیسیسوں اور تھلیریوں سسیسی مہلک بیماریوں کو بھی منتقل کر سکتے ہیں۔

علامات:

- جانوروں پر چیپڑا کثر دکھائی دیتے ہیں شروع میں جب وہ جانور پر چکتے ہیں تو وہ چپٹے اور سرخ کھنچی رنگ کے ہو سکتے ہیں، جب وہ خون سے بھر جاتے ہیں تو وہ زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں اور اکثر نیلے سرخی رنگ کے اور گول ہوتے ہیں۔
- زیادہ تعداد میں چیپڑوں کا ہونا مندرجہ ذیل باقتوں کا سبب بنتا ہے۔



✓ خون کی کمی

✓ وزن میں کمی

✓ دودھ کی پیداوار میں کمی

✓ بخار

✓ وزن میں بڑھو تری ناہونا۔

تشخیص

چیپڑ کو عام آنکھ سے دیکھا جاسکتا ہے۔ جانور کے جسم کو جانپنے کے لیے بغل، پونچھ کے نیچے کا حصہ اور کانوں کے نیچے کا حصہ اہم مقام ہیں۔

جانوروں میں چیپڑ کیسے آتے ہیں

- جانوروں پر موجود مادہ چیپڑا گھانس یا عمارتوں کے فرش پر انڈے دیتی ہے اور جب وہ انڈے پھوٹتے ہیں تو ان میں سے چھوٹے چیپڑے ہنگامے میں مختلف قسم کے چیپڑ مختلف جگہوں پر انڈے دینے کو ترجیح دیتے ہیں۔
- جانوروں پر چھوٹے چیپڑا کی کوئی جگہ (جہاں چھوٹے چیپڑ موجود ہوں) سے چھڑ سکتے ہیں۔
- کچھ چیپڑ اپنی پوری زندگی ایک جانور پر گزار دیتے ہیں اور کچھ ایک جانور سے دوسرے پر منتقل ہوتے ہیں۔

علاج:

- کم تعداد میں موجود چیپڑوں کو علاج کی ضرورت نہیں ہوتی جس جانور پر زیادہ تعداد میں چیپڑ موجود ہوں اس کا علاج کمیکل اسپرے یا پھرا نجیکشنا / یونکے کی مدد سے کیا جاسکتا ہے۔ علاج کے لیے ایسے طریقے کو منتخب کرنا چاہیے جو جانوروں کے حساب سے آپ کے لیے آسان ہو، جس کی دوام ہیاہو اور آپ کے آس پاس اس علاج کی سہولت موجود ہو۔ لیبل پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں کیونکہ کچھ دوائیں حاملہ اور دودھ دینے والے جانوروں پر استعمال نہیں کی جاسکتی۔
- انجیکشن

- آئیور میکلٹ (Ivermectin) ۱٪ ایل نجیکیتبا ۵۰ کلوگرام وزن کے حساب سے چڑی میں لگائیں
- پور آن کیمیکل / اسپرے
- ۷ ملی لیٹر دوا ۷ ملی لیٹر پانی میں محلول بنائیں (Cypermethrin Cyprin, Ectofleece)
- کیمیکل کو ملاتے وقت اور جانور پر استعمال کرتے وقت دستانے پہنیں، بچا ہوا کیمیکل پانی کی نالیوں میں ناچھینکیں

احتیاط:

- گھنٹ والی جگہوں پر اسپرے نہ کیا جائے
- جانور جب پیاسا ہو اور شدید گرمی ہو تو اسے دوامے محلول میں غوطہ نہ دیں
- محلول کو گھانس اور پینے کے پانی سے دور رکھیں
- حاملہ اور دودھ والے جانور پر استعمال نہ کریں

چیپڑوں سے بچاؤ کے قدرتی طریقے:

مرغیان اور پرندے چیپڑوں کا شکار کرتے ہیں اس لیے یہ چیپڑوں کو جانوروں کی رہنے کی جگہ اور باڑوں میں کم کرنے کا بہت کارآمد طریقہ ہے۔

چیپڑوں سے بچاؤ کے گھریلو ٹکنیک:

دو کپ سر کا ۱ کپ پانی میں شامل کر کے عمارت اور باڑوں میں اسپرے کریں

چیپڑوں کا بندوبست اور روک تھام

مندرجہ ذیل باتیں چیپڑوں پر قابو پانے میں کام آتی ہیں

- دیواروں کے پاس۔ کچرے کو بلکن آگ لگا کر ڈھوان کرنے سے چیپڑوں کو دور رکھا جاسکتا ہے
- چھوٹے چیپڑوں کی رہنے کی جگہ ختم کرنے کے لیے فرش پر بچائی ہوئی گھاس اور لکڑیاں وغیرہ اٹھا کر دور منتقل کر لی جائیں
- خود چیپڑوں کو ہٹانے کے لیے ہاتھوں کی مدد سے چیپڑوں کو جانور کے جسم کے بلکل قریب سے کپڑا کر گھماکیں کر اور کھینچ کر اتارا جائے
- ذیادہ تعداد میں چیپڑوں کے جملے والی جگہ اور باڑوں کو کیمیکل اسپرے جیسے کہ ٹرائیکلوروفون (Trichlorfon) اسپرے (مثل لگای فون، Tegafon، اکٹوفون Ectofon) اور سپگوان (Seguan) سے صاف کیا جاسکتا ہے۔
- اس کو استعمال کرنے کے لیے ۷۰.۵ گرام ٹرائیکلوروفون کو ایک لیٹر پانی میں ملا کر استعمال کریں۔



احتیاط:

لیبل پر موجود تمام ہدایات پر عمل کرنا چاہیے، کھانے کی چیزوں یا پانی کو اس سے بچائیں اور انسانوں سے رابطے سے گریز کریں۔

